

2018 年临床执业医师第一次全国水平测试卷

一、A1 型题

1. 前置胎盘时阴道流血特征是

- A. 无诱因、无痛性反复阴道流血
- B. 有痛性阴道流血
- C. 阴道流血常与外伤有关
- D. 阴道流血量与贫血程度不相符
- E. 休克程度多与阴道流血量不成正比

2. 新生儿生理性体重下降发生在出生后

- A. 第 5 周
- B. 第 4 周
- C. 第 3 周
- D. 第 2 周
- E. 第 1 周

3. 轻型和重型腹泻的主要鉴别点是

- A. 体温高低
- B. 肠鸣音次数
- C. 腹泻次数
- D. 水、电解质紊乱
- E. 腹痛

4. 预防哪种传染病对预防小儿结核病有较大意义

- A. 猩红热
- B. 肝炎
- C. 麻疹
- D. 菌痢
- E. 流脑

5. 新生儿从初乳中获得的 Ig 主要是

- A. IgE

B. IgG

C. IgD

D. IgM

E. SIgA

6. 关于缺铁性贫血, 下列叙述不正确的是

- A. 年长儿可有头晕、眼前发黑、耳鸣等
- B. 注意力不集中, 记忆力减退
- C. 食欲减退, 可出现异食癖
- D. 免疫功能低下, 易合并感染
- E. 年龄愈大, 肝脾肿大越明显

7. 典型麻疹的出疹顺序是

- A. 先耳后, 延及额面部、颈部, 而后躯干、四肢
- B. 先额部, 枕后, 延及躯干、而后四肢
- C. 先额部, 面部, 后躯干、四肢
- D. 先躯干, 后四肢, 最后头面部
- E. 先前胸, 后背部, 延及四肢、手心、脚底

8. 羊水栓塞最早出现的症状是

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性肝功能衰竭
- C. 急性肾功能衰竭
- D. 急性呼吸衰竭
- E. 急性 DIC

9. 胎儿完成内旋转动作是指

- A. 胎头双顶径与母体骨盆入口斜径一致
- B. 胎头矢状缝与母体骨盆入口横径一致
- C. 胎头矢状缝与母体骨盆出口横径一致

- D. 胎头双顶径与母体骨盆出口前后径一致
E. 胎头矢状缝与母体中骨盆及骨盆出口前后径一致

10. 分娩时最主要的产力是

- A. 子宫收缩力
B. 肛提肌收缩力
C. 腹肌收缩力
D. 膈肌收缩力
E. 腹压

11. 子宫肌瘤发生红色样变常见于

- A. 妊娠期
B. 月经中期
C. 绝经前期
D. 红斑狼疮治疗期
E. 青春期

12. 张力性气胸的典型临床表现是

- A. 缺氧性躁动
B. “Beck”三联征
C. 纵隔扑动
D. 重度或极度呼吸困难及广泛性皮下气肿
E. 反常呼吸

13. 闭合性单处肋骨骨折的处理原则是

- A. 镇痛
B. 肋骨钉、肋骨爪固定
C. 不锈钢丝固定
D. 胸廓成形术
E. 气管切开

14. 最能反映小叶性肺炎的病变特征的是

- A. 支气管化脓性炎

- B. 病灶多位于背侧和下叶
C. 病灶相互融合或累及全叶
D. 病变累及肺小叶范围
E. 细支气管及周围肺泡化脓性炎

15. PPD 试验假阴性常见于

- A. 患麻疹 3 个月后
B. 急性粟粒型肺结核
C. 接种卡介苗 8 周后
D. 患支气管肺炎时
E. 未接种卡介苗

16. 心力衰竭患者水肿通常首先出现在

- A. 眼睑
B. 四肢
C. 颜面
D. 身体最低部位
E. 腹部

17. 对于阵发性夜间呼吸困难发生的可能机制, 以下哪一项是错误的

- A. 入睡时迷走神经兴奋性增高, 小支气管收缩, 影响肺泡通气
B. 卧位时膈上抬, 肺活量减少
C. 卧床后, 左室不能承受回流增多的血量, 左室舒张末压升高
D. 熟睡时呼吸中枢敏感性降低
E. 由支气管痉挛引起

18. 梗阻性肥厚型心肌病心脏杂音的特点是

- A. 剧烈运动时减弱
B. 紧握双拳时增强
C. 进食可减弱

D. 含服硝酸甘油后增强

E. 服用 β 受体阻断剂后增强

19. 用硝酸甘油类药物使肥厚型梗阻性心脏病患者的症状加重的原因是

A. 扩张了小静脉, 左室射血分数增加

B. 扩张大动脉, 降低了周围血压

C. 扩张了小静脉, 使回心血量减少

D. 冠状动脉收缩

E. 心肌氧耗量增加

20. 冠心病时诊断冠状动脉病变的金标准是

A. 心电图

B. Holter

C. 放射性核素

D. CT

E. 冠状动脉造影

21. 心绞痛发作时的疼痛性质是

A. 针扎样刺痛, 反复发作

B. 闪电样抽痛, 起止突然

C. 刀割样疼痛, 辗转呻吟

D. 尖锐样刺痛, 咳时加剧

E. 压榨样闷痛, 伴窒息感

22. 心肌梗死最常发生在哪个部位

A. 右心室后壁

B. 左心室后壁

C. 右心室前壁

D. 左心室前壁

E. 以上都不对

23. 下列哪项符合恶性高血压特征性病理变化

A. 肾出球小动脉玻璃样变

B. 肾细动脉壁纤维素样坏死

C. 肾小球毛细血管内透明血栓

D. 肾动脉粥样硬化

E. 肾入球小动脉痉挛

24. 心脏骤停的最常见原因是

A. 缓慢性心律失常

B. 心室停顿

C. 室颤和室速

D. 无脉性电活动

E. 精神因素

25. 风心病二尖瓣狭窄患者经常出现呼吸困难、咳嗽和咯血等症状, 随病程延长, 上述症状减轻, 但出现腹胀、肝大, 提示

A. 二尖瓣狭窄程度减轻

B. 发生二尖瓣关闭不全

C. 合并主动脉瓣狭窄

D. 合并主动脉瓣关闭不全

E. 合并右心功能不全

26. 引起左室后负荷增高的主要因素是

A. 肺循环高压

B. 体循环高压

C. 回心血量增加

D. 主动脉瓣关闭不全

E. 红细胞压积增大

27. 血尿伴排尿时痛, 尿流中断或排尿困难见于

A. 肾结石

B. 膀胱结石

C. 膀胱炎

D. 肾炎

E. 肾盂肾炎

28. 急性细菌性前列腺炎直肠指诊应禁忌用力按摩前列腺, 因为

A. 疼痛

B. 引起小便

C. 防止感染蔓延

D. 引起大便

E. 引起恶心

29. 有关泌尿系梗阻, 下列哪一项是错误的

A. 膀胱以上梗阻肾积水进展快

B. 膀胱以上梗阻一般仅累及一侧肾脏

C. 膀胱以下梗阻对肾影响更快

D. 膀胱以下梗阻可累及双侧肾

E. 泌尿系任何部位都可发生梗阻, 梗阻持续加重, 均可导致肾功能损害

30. 蛋白尿为成人尿蛋白超过

A. 150mg/d

B. 350mg/d

C. 180mg/d

D. 300mg/d

E. 250mg/d

31. 精索静脉曲张以哪侧发病居多

A. 左侧

B. 右侧

C. 中间

D. 以上均多见

E. 以上均少见

32. 临床上鉴别肾小球源性血尿与非肾小球源性血尿最简单的方法是

A. 新鲜尿离心沉渣相差显微镜检查

B. 新鲜尿离心沉渣显微镜检查

C. 新鲜尿离心沉渣高倍镜检查

D. 新鲜尿离心沉渣油镜检查

E. 肉眼观察尿的颜色

33. DIC 引起的贫血是

A. 再生障碍性贫血

B. 失血性贫血

C. 微血管病性溶血性贫血

D. 中毒性贫血

E. 缺铁性贫血

34. 当前治疗慢性粒细胞白血病慢性期首选的化疗药物是

A. 马利兰

B. 羟基脲

C. 靛玉红

D. 美法仑

E. 高三尖杉酯碱

35. 霍奇金淋巴瘤的诊断细胞是

A. R-S 细胞

B. 霍奇金细胞

C. 陷窝细胞

D. 多形性瘤细胞

E. 白细胞

36. 特发性血小板减少性紫癜最常见于

A. 幼儿

B. 儿童

C. 青年女性

D. 壮年男性

E. 都有可能

37. 成年人血红蛋白中珠蛋白的主要组成是由

A. $\alpha_1\beta_1$

B. $\alpha_2\epsilon_1$

C. $\alpha_2\gamma_2$

D. $\alpha_2\beta_2$

E. α_2

38. 氨基酸的活化

A. 氨基酸与特异的 tRNA 结合

B. 氨基酸与特异的 mRNA 结合

C. 氨基酸与特异的 N-端结合

D. 氨基酸与特异的 C-端结合

E. 氨基酸与特异的 sRNA 结合

39. 氨从肌肉组织到肝脏的途径是

A. 鸟氨酸循环

B. 三羧酸循环

C. 丙氨酸-葡萄糖循环

D. 甲硫氨酸循环

E. ATP 循环

40. 有效循环血量是指

A. 维持正常代谢所需血量

B. 包括存于肝、脾和淋巴窦及停滞于循环中血量

C. 全身血容量

D. 单位时间内通过心血管系统进行循环的血量

E. 机体容量血管内所储存的血量

41. 人被狂犬病毒感染后, 应及时接种狂犬病病毒灭活疫苗, 时间错误的是

A. 伤后第 0 天

B. 伤后第 3 天

C. 伤后第 7 天

D. 伤后第 10 天

E. 伤后第 28 天

42. 真菌孢子的主要作用是

A. 起黏附作用

B. 抗吞噬作用

C. 引起变态反应

D. 引起超敏反应

E. 进行繁殖

43. Th1 细胞的功能包括

A. 促进 CTL 杀伤肿瘤细胞

B. 增强吞噬细胞介导的抗感染免疫

C. 是迟发型超敏反应中的效应细胞

D. 促进 NK 细胞的杀伤功能

E. 以上均是

44. 血清中含量最高的 Ig 是

A. IgG

B. IgA

C. IgM

D. IgN

E. IgD

45. 癌前病变的定义是

A. 早期浸润癌

B. 良性肿瘤的恶变

- C. 恶性度高的肿瘤
- D. 有可能癌变的良性病变
- E. 有可能转变成鳞癌的良好病变

46. 下列哪项是血栓形成的条件

- A. 血管内皮损伤
- B. 新生血小板增多
- C. 涡流形成
- D. 组织因子释放
- E. 以上都是

47. 心理冲突的类型不包括

- A. 双避冲突
- B. 双趋冲突
- C. 趋避冲突
- D. 多重趋避冲突
- E. 矛盾冲突

48. 对强直性脊柱炎临床表现叙述错误的是

- A. 早期可无明显体征
- B. 早期可出现局部压痛
- C. 随着病情进展可见腰椎前凸消失
- D. 随病情进展腰椎活动度不变
- E. 病情活动期可有韧带、肌腱与骨附着点压痛

49. 类风湿关节炎常见的关节表现是

- A. 对称性近端指间、掌指和腕关节持续性肿痛
- B. 胸锁关节肿痛
- C. 膝关节单侧或双侧肿痛, 休息后好转
- D. 单侧第一跖趾关节剧烈肿痛
- E. 以上都是

50. 1 型糖尿病与 2 型糖尿病的主要区别在于

- A. 发病年龄不同
- B. 对胰岛素的敏感性不同
- C. 胰岛素基础水平与释放曲线不同
- D. 发生酮症酸中毒的倾向不同
- E. 是否存在胰岛素抵抗

51. 针对尖锐湿疣不合适的处理措施是

- A. 局部用药为主
- B. 孕妇无需用药, 选择剖宫产终止妊娠即可
- C. 大的尖锐湿疣可行手术切除
- D. 治疗期间禁止性生活
- E. 可用冷冻治疗, CO₂激光治疗

52. 对于子宫内膜异位症的临床表现, 说法错误的是

- A. 痛经逐年加剧
- B. 痛经程度与病灶大小成正比
- C. 40%患者不孕
- D. 周期性腹痛不一定与月经同步
- E. 直肠子宫陷凹有异位病灶可有性交痛

53. 下列产褥期临床表现与处理不正确的是

- A. 产后 1 天会阴水肿——红外线照射
- B. 产后 4 小时尿潴留——诱导排尿
- C. 产后 10 小时, 体温 37.9℃——观察
- D. 产后 7 天下腹痛——镇痛药止痛
- E. 产后 3 天会阴伤口化脓——拆线扩创

54. 发生哺乳期急性乳腺炎的主要病因是

- A. 乳晕皮肤皲裂
- B. 乳汁淤积细菌侵入

C. 乳腺组织发育不良

D. 乳汁分泌障碍

E. 乳腺囊性增生病

55. 引起手术切口血肿最主要的原因是

A. 伤口裂口

B. 术前服用阿司匹林

C. 高血压控制不满意

D. 术中止血不彻底

E. 伤口感染继发出血

56. 水杨酸类制剂在溃疡性结肠炎治疗中，

主要适用于

A. 轻、中度病例

B. 重度病例

C. 中毒性巨结肠

D. 激素治疗无效者

E. 顽固病例

57. 下列哪种是克罗恩病最有诊断意义的病理改变

A. 肠腺隐窝脓肿

B. 炎性息肉

C. 肠瘘形成

D. 肠壁非干酪样上皮样肉芽肿

E. 肠系膜淋巴结肿大

58. 内痔的早期症状是

A. 排便时疼痛

B. 内痔脱出

C. 里急后重

D. 肛门瘙痒

E. 排便时出血

二、A2 型题

59. 女，60 岁。上腹胀痛伴恶心。呕吐 2 天，右下腹痛阵发加剧、腹胀半天。查体：T 38.3℃，P 120 次/分，BP 150/90mmHg，全腹压痛(+)，右下腹明显，有肌紧张，肝浊音界存在，未闻及肠鸣音。实验室检查：WBC $13.0 \times 10^9/L$ ，N 0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体 2ml，镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是

A. 重症急性胰腺炎

B. 绞窄性肠梗阻

C. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎

D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎

E. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎

60. 男性，16 岁，体育课后由于右下腹转移性疼痛伴有发热来诊，该患者最可能的是

A. 急性胆囊炎

B. 急性胃炎

C. 急性阑尾炎

D. 急性腹膜炎

E. 急性胰腺炎

61. 患者，女，30 岁，足月妊娠分娩后半年，阴道不规则流血，子宫略大，左附件区可触及一直径约 3cm 包块，尿 HCG (+)，胸片示双下肺可见棉球状阴影。最可能的诊断是

A. 侵蚀性葡萄胎

B. 绒毛膜癌

C. 葡萄胎残留

D. 子宫内膜异位症

E. 异位妊娠

62. 女，30 岁。白带增多伴腥臭味 1 个月，妇科检查见阴道分泌物呈稀薄灰白色，镜检发现线索细胞，考虑诊断

A. 滴虫阴道炎

B. 念珠菌阴道炎

C. 细菌性阴道炎

D. 支原体性阴道炎

E. 衣原体性阴道炎

63. 女，25 岁。夜间排尿后突然右下腹剧痛，随后恶心、呕吐。平时月经规律，末次月经为 10 天前。妇科检查子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块，触痛，推移后疼痛加剧。首先考虑

A. 输卵管妊娠破裂

B. 急性阑尾炎

C. 急性附件炎

D. 卵巢囊肿蒂扭转

E. 卵巢黄体破裂

64. 初孕妇，24 岁。妊娠 38 周。头痛 1 周，喷射性呕吐 1 次。半小时前突然抽搐随即昏迷入院。查体：BP 170/110mmHg，尿蛋白(+++)，眼底检查视网膜出血、视乳头水肿。

本例首选的紧急处理是

A. 静脉推注硫酸镁

B. 静脉滴注白蛋白

C. 静脉滴注硝普钠

D. 静脉快速滴注呋塞米

E. 静脉注射地西泮

65. 1 岁半男性患儿，因“感冒发烧”自行在家口服抗生素治疗，3 小时前突发肢体抽搐，眼球上翻，神志不清，遂来院就诊，门诊查体温：39.5℃，查体：咽部充血、心肺腹未见明显异常。查体：咽红，心肺腹及神经系统无异常，半年前也有相同病史，最可能诊断是

A. 癫痫

B. 低钙惊厥

C. 中毒性脑病

D. 化脓性脑膜炎

E. 高热惊厥

66. 3 个月男婴，冬季出生，足月顺产，生后一直母乳喂养，未添加辅食，体检：体重 6kg，枕秃明显，患儿易激、烦闹、夜间哭闹不安，多汗。首先考虑的原因为

A. 人乳中酪蛋白含量较少

B. 人乳中乙型乳糖含量较少

C. 人乳中饱和脂肪酸含量较少

D. 人乳中维生素 D 含量较低

E. 人乳中维生素 K 含量较低

67. 1 岁男婴，多汗，枕秃，方颅，常发生无热惊厥。辅助检查示：血糖 3.5mmol/L、血钙 6.5mg/dl、血镁 1mg/dl、血磷 12mg/dl。该小儿可能的疾病是

A. 维生素 D 缺乏性佝偻病

B. 低血糖症

C. 婴儿痉挛症

D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

E. 低镁血症

68. 男, 1 岁, 智能落后, 表情呆滞, 鼻梁低, 舌宽大并常伸出口外, 皮肤苍黄、粗糙, 四肢粗短, 腱反射减弱。最可能的诊断是

A. 唐氏综合征 (21-三体综合征)

B. 软骨发育不良

C. 先天性甲状腺功能减低症

D. 佝偻病

E. 苯丙酮尿症

69. 女婴, 4 个月, 因受凉后突然喘憋急诊入院。入院体检: T 37.5°C, 烦躁, 气促。口周发绀, 心率 196 次/分。心音被响亮的哮鸣音掩盖, 吸气末少量中细湿性啰音。腹软, 肝肋下 2cm, 剑下 2cm, 上界第 6 肋间, 脾未触及。WBC $9.8 \times 10^9/L$, N 0.5, 以下诊断可能性最大的是

A. 金黄色葡萄球菌肺炎

B. 腺病毒肺炎

C. 白色念珠菌性肺炎

D. 呼吸道合胞病毒肺炎

E. 肺炎支原体肺炎

70. 6 个月女婴, 发热 3 天, 体温 39°C, 查体: 一般情况良好, 咽充血, 耳后淋巴结肿大, 心肺无异常, 肝脾未触及。若患儿热退后, 伴皮疹出现, 可能的诊断是

A. 带状疱疹

B. 疱疹性咽峡炎

C. 风疹

D. 麻疹

E. 幼儿急疹

71. 男, 3 个月。健康婴儿。体重 5kg, 用牛奶喂养, 一般每天应给予 8%糖牛奶和另给水分的量分别是

A. 300ml 和 100ml

B. 400ml 和 100ml

C. 500ml 和 250ml

D. 600ml 和 300ml

E. 650ml 和 350ml

72. 女性, 32 岁, 药物流产后 5 天, 高热伴右下腹痛 2 天。妇检: 白带脓性, 宫颈举痛, 宫体如妊娠 6 周, 右附件区有明显压痛。本例最可能的诊断是

A. 宫外孕

B. 卵巢瘤蒂扭转

C. 急性盆腔炎

D. 卵巢巧克力囊肿破裂

E. 急性阑尾炎

73. 女, 34 岁, 妊娠 31 周, 少量阴道流血, 以往曾有 3 次早产史。主要处理应是

A. 抑制宫缩, 促进胎儿肺成熟

B. 注意休息, 并给以镇静剂

C. 左侧卧位及吸氧

D. 任其自然

E. 氧气吸入, 给予止血剂

74. 初孕妇, 30 岁, 子痫前期, 3 小时前突然腹痛伴阴道流血, 色鲜红, 量较多, 查体: P 为 116 次/分, BP 为 100/80mmHg, 子宫板状硬, 胎位不清, 胎心消失, 宫颈管未消失, 宫口未开大。该患者最可能的诊断是

- A. 子宫破裂
- B. 先兆子宫破裂
- C. 胎盘早剥
- D. 前置胎盘
- E. 早产

75. 女, 28 岁, 妊娠 35 周, 超声检查为完全性前置胎盘。无宫缩, 宫口未开。胎心率 140 次/分, 血压 13.3/10.6kPa, 应即刻采取的措施是 (1kpa=7.5mmHg)

- A. 人工破膜
- B. 阴道检查
- C. 剖宫产
- D. 期待疗法
- E. 以上均可

76. 28 岁, 初产妇, 足月妊娠, 胎儿娩出后 4 分钟, 出现大量阴道流血, 最可能的原因是

- A. 严重宫内感染
- B. 宫颈裂伤
- C. 子宫收缩乏力
- D. 胎盘部分剥离
- E. 凝血功能障碍

77. 女, 37 岁, 1 周前突起寒战高热伴胸痛, 咳铁锈色痰。X 线胸片示右下肺炎。青霉素

肌注每次 160 万 U, 每天 3 次, 6 天后患者仍高热, 且右胸饱满, 呼吸音消失。下列检查最重要的是

- A. 血培养
- B. 多次痰培养
- C. 肺功能测定
- D. X 线胸片及胸部 B 超
- E. 纤维支气管镜检查

78. 男, 28 岁, 吸烟患者, 因低热、咳嗽 2 月余, 痰中带血 1 周来院门诊。查体: T 37.5℃, 双侧颈后可触及多个可活动之淋巴结, 右上肺可闻及支气管肺泡音, 胸片示右上肺云雾状阴影。最可能的诊断是

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 支气管肺癌
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

79. 男, 60 岁, 咳嗽、咳痰 3 月余, 右胸痛 1 月, 胸片示左下肺圆形阴影 2cm×2cm 左右, 有毛刺, 肋骨有骨质破坏。最可能的诊断是

- A. 周围型肺癌
- B. 肺癌 (中央型)
- C. 细支气管肺泡癌
- D. 肺脓肿
- E. 肺结核球

80. 男, 21 岁。发作性喘息 4 年, 再发 1 天急诊入院, 查体: 端坐呼吸, 口唇发绀, 双

肺广泛哮鸣音, 心率 120 次/分。该患者最可能的诊断是

A. 自发性气胸

B. 肺血栓栓塞

C. 急性左心衰竭

D. 慢性支气管炎急性发作

E. 支气管哮喘

81. 女, 70 岁。急腹症入院, 急救过程中先后出少尿、肺水肿、呼吸困难、嗜睡、意识障碍、消化道出血等症状, 应诊断为

A. DIC

B. AFR

C. MODS

D. ARDS

E. Curling 溃疡

82. 患者, 男, 58 岁, 因脑梗死住院半月, 近 6 天来, 出现高热、咳嗽, 咳血痰, 查体: T 39.5℃, 意识模糊, 呼吸急促, 口唇发绀, 双肺散在湿啰音, 血常规 WBC $20 \times 10^9/L$, N 0.90。胸片: 右肺大片状阴影, 其中可见多个气囊腔, 该患者最可能的诊断是

A. 金黄色葡萄球菌肺炎

B. 肺炎链球菌肺炎

C. 肺炎支原体肺炎

D. 干酪性肺炎

E. 真菌性肺炎

83. 女, 62 岁。高血压患者, 突然心悸、气促, 咳粉红色泡沫样痰。查体: 血压 200/126mmHg, 心率 146 次/分。除其他治疗

外, 还应选用下列药物中的

A. 毛花苷 C、硝酸甘油、异丙肾上腺素

B. 毒毛花苷 K、硝普钠、普萘洛尔

C. 胍乙啶、酚妥拉明、毛花苷 C

D. 硝普钠、毛花苷 C、呋塞米

E. 硝酸甘油、毛花苷 C、多巴胺

84. 女性, 66 岁, 充血性心衰, 房颤, 心率长期在 100~120 次/分, 口服地高辛 0.25mg/d, 2 周后心率无明显下降, 为进一步控制心率, 应首选

A. 苯妥英钠

B. 维拉帕米

C. 螺内酯

D. 加大洋地黄的剂量

E. 硝酸甘油

85. 42 岁男性, 1 年前出现左下肢行走数分钟后胀痛。休息片刻缓解, 再行走后疼痛又出现。无吸烟史, 发病前半年左足部外伤已治愈, 体格检查: 左下肢皮色较苍白, 左足背动脉未触及。最可能的诊断是

A. 动脉粥样硬化性闭塞症

B. 血栓闭塞性脉管炎

C. 雷诺病

D. 多发性大动脉炎

E. 结节性动脉周围炎

86. 女性, 26 岁。阵发性心慌 2 年, 每次心慌突然发生, 持续半小时至 2 小时不等。本次发作时心律齐, 心率 200 次/分, 按摩颈动脉窦心律能突然减慢至正常, 心电图 QRS

波形态正常, P 波不明显。诊断为

- A. 心房扑动
- B. 窦性心动过速
- C. 心房颤动
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 阵发性室性心动过速

87. 患者 30 岁, 为原发性肾病综合征患者, 首次治疗, 每日用泼尼松 60mg, 3 周后尿蛋白仍为++++, 此时应

- A. 每 1~2 周减原用量的 10%
- B. 改用氮芥
- C. 改为细胞毒药物+环磷酰胺
- D. 用原量继续观察
- E. 减少泼尼松用量到 40mg/d, 加用免疫抑制剂

88. 患者男性, 25 岁, 出现尿频、尿急、尿痛、排尿烧灼感, 排尿困难。诊断急性细菌性前列腺炎, 致病菌多为

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 假单胞菌

89. 男性, 25 岁, 发生左侧腹部及左下胸部撞击伤 3 小时。检查: 神志清, 体温 37℃, 血压 80/60mmHg, 脉率 120 次/分。左侧腹压痛, 有轻度反跳痛及肌紧张, 血白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。尿检红细胞 20 个/HP, 正确的急救处理是

- A. 大剂量抗菌药物治疗

B. 输血、输液

C. 密切观察

D. 纠正休克的同时, 考虑立即剖腹探查

E. 应用 25%甘露醇静注, 密切观察尿液的变化

90. 男性, 50 岁, 因无痛性肉眼全程血尿就诊, 经检查诊断为肾癌, 关于肾癌的临床表现, 以下哪项是错误的

- A. 血尿、疼痛或肿块都出现时已是晚期
- B. 可有腰部钝痛, 有时亦可出现肾绞痛
- C. 肿块可在腹部或腰部出现
- D. 肾外表现有高热、低血压、红细胞减少等
- E. 间歇无痛肉眼血尿为常见症状

91. 10 个月女婴, 面色苍白, 食欲差。Hb 65g/L, RBC $2.7 \times 10^{12}/L$, 网织红细胞 1%, 肝肋下 2.5cm, 脾肋下 0.5cm。为确诊应首选的检查是

- A. 骨髓检查
- B. 红细胞脆性试验
- C. 测血清铁和总铁结合力
- D. 测维生素 B₁₂ 和叶酸浓度
- E. 血红蛋白电泳

92. 老年男性, 近两个月出现面色苍白, 无力, 反复发生感染, 经骨穿细胞学检查诊断为骨髓增生异常综合征, 为进行 FAB 分型, 最重要的检查是

- A. 血象
- B. 骨髓铁染色
- C. 染色体检查

D. 流式细胞学检查

E. 铁蛋白饱和度

93. 男孩, 11 岁, 因腹痛来院就诊。查体: 双下肢出现对称性成片状小出血点, 尿常规发现血尿 (+++), 该患者最可能的诊断是

A. 肾血管畸形

B. 过敏性紫癜肾炎

C. 肾绞痛

D. 急性肾盂肾炎

E. 肾下垂

94. 女性, 48 岁, 发热伴对称性多关节肿痛, 晨僵 3 个月, 查 ANA 滴度阳性, RF (+), IgG 和补体升高, 最可能的诊断是

A. 多肌炎

B. 系统性红斑狼疮

C. 类风湿性关节炎

D. 干燥综合征

E. 混合性结缔组织病

95. 女性, 20 岁, 1 型糖尿病患者, 出现恶心、厌食 2 天, 神志不清 1 小时, 查体: 面色潮红, 呼吸深快, 意识障碍。诊断方面最可能是

A. 糖尿病酮症酸中毒

B. 糖尿病高渗性昏迷

C. 乳酸性酸中毒

D. 糖尿病合并尿毒症酸中毒

E. 低血糖昏迷

96. 男性, 38 岁, 体力劳动者, 体重 60kg。在外游玩迷路, 4 天后获救, 出现口渴、躁

狂, 体重降至 55kg, 血清钠为 155mmol/L。

该患者初步诊断为

A. 等渗性缺水

B. 水中毒

C. 轻度缺水

D. 中度缺水

E. 重度缺水

97. 8 岁男孩, “高热 1 天” 就诊。病前吃过未洗的黄瓜。患儿精神萎靡、面色灰白、四肢厥冷、脉速, 大便呈黏液脓血便, 镜检有多量脓细胞、红细胞和吞噬细胞。目前最有可能的诊断是

A. 高热惊厥

B. 流行性乙型脑炎

C. 肠伤寒

D. 中毒型菌痢

E. 肠结核

98. 某实习医师接诊到一重症肌无力患者, 下述检查项目中, 对其诊断没有帮助的是

A. 疲劳试验

B. 腾喜龙试验

C. 新斯的明试验

D. 神经重复频率刺激检查

E. 脑脊液检查

99. 男, 30 岁。两年来无原因地认为同事指桑骂槐地议论他, 街上行人的举动及电视内容都针对他。为之心情烦躁, 不敢上班。该患者的精神症状最可能是

A. 影响妄想

B. 情感脆弱

C. 恐惧症

D. 关系妄想

E. 焦虑症

100. 患儿 5 岁, 阵发性头痛 3 个月, 因突然剧烈头痛、反复呕吐半天急诊入院, 检查: 神志清醒, 双瞳孔正常, 颈项强直, 半小时后突然呼吸停止, 心跳存在, 其诊断是

A. 垂体腺瘤

B. 急性脑水肿

C. 急性脑膜炎

D. 枕骨大孔疝

E. 小脑幕切迹疝

101. 老年男性患者, 诊断为脑血栓形成, 病例讨论会上级医师提问: 在其发病机制中, 最常见的病因是

A. 动脉硬化

B. 高血压

C. 动脉壁炎症

D. 真性红细胞增多症

E. 血高凝状态

102. 男, 32 岁。由高处跌落, 引起骨盆骨折及股骨开放性骨折, 伤口大量出血, 并已出现休克症状, 现场急救治疗首先应进行

A. 包扎的同时进行抗休克治疗

B. 有伤下肢临时固定

C. 清创缝合

D. 加压包扎止血

E. 给予输血

103. 患者女, 31 岁, 慢性膀胱刺激症状逐渐加重 3 个月。KUB+IVU 见右肾有钙化影, 肾影增大, 无功能。最可能的诊断是

A. 右肾肿瘤

B. 右肾结石

C. 右肾积水

D. 肾盂肾炎

E. 右肾结核

104. 男性, 50 岁。从事印刷工作, 最近出现头晕、头痛、无力、失眠、多梦等。考虑为职业性中毒, 生产性毒物主要通过哪种途径进入体内

A. 毛囊

B. 皮肤

C. 消化道

D. 呼吸道

E. 眼睛

105. 某患者, 疑似霍乱, 需要及时隔离, 甲类传染病患者实施强制隔离措施时, 应当遵循的公共卫生伦理原则是

A. 社会公正原则

B. 全社会参与原则

C. 互助协同原则

D. 以病人为中心原则

E. 信息公开原则

106. 林某中等卫校毕业, 在乡卫生院工作, 2000 年取得执业助理医师执业证书。他要参加执业医师资格考试, 根据《执业医师法》规定, 应取得执业助理医师执业证书后, 在

医疗机构中工作满

- A. 6 年
- B. 5 年
- C. 4 年
- D. 3 年
- E. 2 年

107. 一对农村夫妇抱着白喉病患儿来院求治, 因患儿呼吸困难, 医生决定马上做气管切开, 但患儿父母不予表态。这时患儿呼吸困难, 面部发绀, 生命垂危。下列做法更符合伦理的是

- A. 家属态度不明时, 顺其自然
- B. 在家属同意治疗但拒绝手术时, 告知后果家属自负
- C. 在家属同意但不签字的情况下, 立即手术
- D. 在家属同意但不签字的情况下, 等待签字后手术
- E. 在家属不同意且又不签字的情况下, 不实施手术

108. 初产妇, 妊娠 39 周, 宫口开全 1.5 小时, 胎头已达盆底, 持续性枕左横位, 处理应是

- A. 等其自然回转
- B. 行会阴后斜切开术
- C. 人工协助顺时针转 90°
- D. 人工协助逆时针转 90°
- E. 催产素静脉滴注

109. 初孕妇, 27 岁。妊娠 38 周, 社区医师诊断为“均小骨盆”转院。不应进行的检查

是

- A. 测量胎心音
- B. 骨盆外测量
- C. X 线骨盆测量
- D. B 型超声检查
- E. 测量身高及体重

110. 男, 59 岁。高血压病史 10 年, 合并糖尿病及胰岛素抵抗。对于该患者以下药物尤其适用的是

- A. 氢氯地平
- B. 依那普利
- C. 美托洛尔
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡维地洛

111. 中年女性, 多汗、流涎, 全身紧束, 家属诉患者服农药并将其送至急诊。检查: 心跳减慢, 瞳孔缩小。急诊洗胃和药物治疗, 其中碘解磷定对以下何种组织作用最明显

- A. 瞳孔
- B. 胃肠道
- C. 腺体
- D. 骨骼肌
- E. 平滑肌

112. 男, 78 岁, 反复上腹胀, 上腹部不适 20 年, 胃镜检查: 胃角切迹可见直径 0.3cm 溃疡, 底部平坦, 边界清楚, 胃黏膜苍白、粗糙, 皱襞稀疏, 其胃黏膜病理检查不可能出现的是

- A. 壁细胞数量增多

B. 淋巴细胞浸润

C. 主细胞减少

三、A3/A4 型题

(113~115 共用题干)

男, 57 岁。3 个月来腹胀、水肿, 1 周来加重伴腹痛。20 年前曾发现 HBsAg (+)。查体: 可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹, 肝未及, 脾肋下 4cm, 全腹压痛, 无明显反跳痛, 移动性浊音阳性。化验: 血清蛋白 24g/L, 血球蛋白 31g/L, 血钾 3.8mmol/L, 血钠 136mmol/L, 血氯 98mmol/L。

113. 该患者最必要的检查是

- A. 腹水常规+细菌培养
- B. 尿常规及尿钠检测
- C. 腹部 B 超检查
- D. 腹部 CT 检查
- E. 胃镜检查

114. 该患者最可能的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 肠梗阻
- C. 自发性腹膜炎
- D. 代谢性酸中毒
- E. 肝肾综合征

115. 该患者最可能的基本诊断是

- A. 原发性肝癌
- B. 乙型肝炎肝硬化
- C. 慢性乙型肝炎
- D. 原发性肾病综合征
- E. 结核性腹膜炎

D. 肠上皮化生

E. 异型性增生

(116~117 共用题干)

经产妇, 32 岁, 足月顺产后 1 天。体温 37.8℃, 下腹阵发性疼痛明显, 哺乳时加重, 影响睡眠。

116. 最可能的诊断是

- A. 产后宫缩痛
- B. 产褥感染
- C. 尿潴留
- D. 盆腔脓肿
- E. 切口感染

117. 治疗应该

- A. 阴道后穹窿穿刺
- B. 停止哺乳
- C. 抗生素治疗感染
- D. 降温
- E. 观察或给予吲哚美辛药物治疗

(118~120 共用题干)

患者, 女, 26 岁, 肥胖、多毛, 婚后 3 年未避孕未孕, 月经 3~4/50~60 天, 量少。

118. 最可能的诊断是

- A. 高催乳素血症
- B. 多囊卵巢综合征
- C. Sheehan 综合征
- D. Asherman 综合征
- E. 空蝶鞍综合征

119. 为明确诊断, 最有意义的检查是

- A. 阴道镜检
- B. 输卵管通液术
- C. 内分泌检查
- D. 头部 CT
- E. 子宫内膜活检

120. 关于其治疗, 说法错误的是

- A. 应纠正肥胖
- B. 可用枸橼酸氯米芬促排卵治疗
- C. 应采用综合性抗雄激素药物降低血雄激素水平
- D. 首选腹腔镜手术
- E. 其近期治疗目的是纠正月经紊乱, 建立排卵性月经周期, 改善生殖功能, 达到妊娠目的

(121~122 共用题干)

男婴, 6 天。近 2 天吃奶少, 反应差, 不哭, 体温不升, 皮肤中度黄染, 脐周红肿, 见脓性分泌物, 肝肋下 3cm。

121. 最可能的诊断是

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿肝炎
- C. 母乳性黄疸
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿硬肿症

122. 哪项治疗最正确

- A. 换血
- B. 光疗
- C. 输血浆
- D. 抗生素

E. 输新鲜血

(123~124 共用题干)

女, 2 岁, 诊断为法洛四联症, 口唇、甲床青紫, 患儿喜蹲, 常喜欢大人抱起, 耐力差, 哭闹及情绪激动时出现气急, 青紫加重。

123. 该患儿合并畸形不包括

- A. 右心室流出道梗阻
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 右心室肥大
- E. 主动脉骑跨

124. 法洛四联症最早出现的临床表现是

- A. 青紫
- B. 蹲踞症状
- C. 阵发性缺氧发作
- D. 杵状指
- E. 心前区隆起

(125~126 共用题干)

8 个月男孩。腹泻 5 天, 每日 10~12 次, 稀水样, 少许黏液, 尿少, 精神萎靡。查体: 呼吸深长, 皮肤花纹, 弹性差。前囟、眼窝明显凹陷, 肢冷, 脉弱, 心率 158 次/分, 心音钝。125. 其可能诊断为

- A. 重度脱水+酸中毒
- B. 中度脱水+酸中毒+心力衰竭
- C. 轻度脱水+低钾血症
- D. 中度脱水+低钾血症
- E. 重度脱水+高钾血症+心力衰竭

126. 为了纠正循环衰竭和改善肾血流, 扩容

阶段用 2: 1 等张含钠液的正确方法是

- A. 20ml/kg, 于 30~60 分钟内静脉输入
- B. 20ml/kg, 速度为每小时 8~10ml/kg, 静脉滴注
- C. 20ml/kg, 速度为每小时 3~5ml/kg, 静脉滴注
- D. 20ml/kg, 8~12 小时静滴完
- E. 立即皮下注射, 20ml/kg

(127~128 共用题干)

8 岁女孩, 因反复发热 3 周就诊, 查体: 发育营养差, 面色苍白, 上下肢皮肤有散在小瘀斑, 胸骨左缘 3~4 肋间听到收缩期杂音, 有震颤, 白细胞 $15 \times 10^9/L$, 血红蛋白 89g/L, 肝脾肿大。尿常规: 蛋白(+), 超声心动图: 有赘生物。

127. 该患儿最可能的诊断为

- A. 法洛三联症
- B. 动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 主动脉狭窄

128. 该患者最可能合并的疾病是

- A. 合并有急性肾炎
- B. 合并左心衰
- C. 合并尿路感染
- D. 合并慢性肾炎
- E. 合并感染性心内膜炎

(129~130 共用题干)

女性, 60 岁, 突发胸痛、呼吸困难 4 小时,

CTPA 显示右下肺动脉干分支多处充盈缺损。

查体: 心率 115 次/分, BP80/60mmHg, 颈静脉怒张, 双肺呼吸音清晰, $P_2 > A_2$, 三尖瓣区可闻及 2/6 级收缩期杂音。左下肢轻度水肿。

129. 下列关于该患者的诊断正确的是

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 肺栓塞
- D. 肺炎
- E. 哮喘

130. 此时应采取的措施为

- A. 手术治疗
- B. 支气管镜治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 静滴 rt-PA
- E. 皮下注射低分子肝素

(131~134 共用题干)

女性, 20 岁, 近 1 月来盗汗、自感乏力, 昨日出现寒战、发热、咯血。查体: 精神差, $T 39.2^{\circ}C$, 左上肺可闻及少量湿啰音。WBC $10.8 \times 10^9/L$, NE 85%, 胸片示左上肺大片状浓淡不均、密度增高的阴影。

131. 此患者大咯血的原因最可能是

- A. 肺间质受累
- B. 肺实质病变
- C. 支气管黏膜受损
- D. 肺结核合并细菌感染
- E. 空洞壁的动脉瘤破裂

132. 若该患者低热持续不退, 多提示

- A. 精神紧张
- B. 咯血吸收
- C. 病变播散
- D. 支气管感染
- E. 肺结核并肺癌

133. 该患者在接受抗结核治疗时, 对疗效的考核首先要看

- A. 痰菌转阴
- B. 症状消失
- C. X 线空洞闭合, 炎性阴影消失
- D. 血沉正常
- E. 血清结核抗体阴性

134. 该患者最可能的诊断是

- A. 左上肺肺炎球菌肺炎
- B. 左上肺变态反应性肺炎
- C. 左上肺支原体肺炎
- D. 左上肺癌
- E. 左上肺干酪性肺炎

(135~138 共用题干)

女性, 60 岁, 反复咳嗽、咳痰 25 年, 心悸、气促、下肢间歇性水肿 3 年, 病情加重伴畏寒发热 1 周入院。体检: T 38°C, 呼吸急促, 口唇发绀, 双肺叩诊过清音, 中下肺有湿啰音, 心率 110 次/分, 心律齐, 无杂音, 双下肢重度水肿。

135. 该病例最适当的诊断为

- A. 慢性支气管炎 (慢支)
- B. 慢支+肺气肿

C. 慢支+肺气肿+肺心病

- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 慢支+肺气肿+心肌病

136. 为明确诊断首选检查是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 心电图检查
- C. 动脉血气分析
- D. 痰培养及药敏试验
- E. 血胆固醇和三酰甘油测定

137. 主要的治疗措施是

- A. 控制感染与改善呼吸功能
- B. 祛痰与止咳
- C. 解痉与平喘
- D. 低浓度持续吸氧
- E. 给予利尿剂和强心剂

138. 假设该病例呼吸困难突然进一步加重, 右肺呼吸音明显较前减弱, 应立即进行的检查是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 心电图
- C. 动脉血气分析
- D. 肺功能
- E. 胸腔 B 超

(139~140 共用题干)

高中学生, 2 小时前爬山途中从高处跌落致腰部受伤, 立即来诊。检查发现双下肢感觉、运动障碍

139. 如果伤后 3 个小时, 患者双下肢感觉、运动逐渐恢复, 其最可能是

- A. 脊髓水肿
- B. 脊髓出血
- C. 脊髓震荡
- D. 脊髓挫伤
- E. 坐骨神经受压

140. 如果伤后患者腹胀、腹痛、大便秘结,

四、B 型题

(141~143 共用选项题)

- A. 血行转移
- B. 血行转移和淋巴转移
- C. 直接蔓延和种植
- D. 直接蔓延和淋巴转移
- E. 种植转移

141. 绒毛膜癌主要播散的方式

142. 子宫颈癌主要播散的方式

143. 卵巢癌主要播散的方式

(144~146 共用选项题)

- A. 卡介苗
- B. 乙型脑炎疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 脊髓灰质炎疫苗
- E. 百白破混合疫苗

144. 初生时接种

145. 生后 2~4 个月时接种

146. 生后 8 个月时接种

(147~148 共用选项题)

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎

可能是由于

- A. 肾脏损伤
- B. 直肠损伤
- C. 膀胱损伤
- D. 骨盆断裂
- E. 腹膜后血肿刺激

B. 肺炎球菌肺炎

C. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

D. 支原体肺炎

E. 军团菌肺炎

147. 男性, 26 岁。发热 2 天, 最高 38.5℃,

铁锈色痰, 胸部 CT 右肺中叶实变影。应为

148. 女性, 70 岁。发热 3 天, 最高 38℃,

砖红色胶冻样痰, 胸部 CT 左肺下叶多发蜂

窝样改变, 叶间裂下坠。应为

(149~150 共用选项题)

- A. 急性膀胱炎
- B. 泌尿系结核
- C. 膀胱结石
- D. 膀胱肿瘤
- E. 急性肾盂肾炎

149. 男性, 40 岁, 有顽固性膀胱刺激症状伴终末血尿, 应首先考虑

150. 男性, 12 岁, 时有膀胱刺激症状, 伴排尿困难及尿流中断, 改变体位后可继续排尿, 应首先考虑