

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 39 期

1. 【问题】产钳术的禁忌症与适应症是什么？

【解答】适应症：①同胎头吸引术。②臀位分娩后出头困难者。③胎头吸引术失败者。

禁忌证：①同胎头吸引术。②胎头骨质部的最低点在坐骨棘水平或以上，有明显头盆不称时。

③确定死胎、胎儿畸形者，应尽可能做穿颅术，以免损伤产道。

2. 【问题】小儿首选的止惊药是地西洋还是苯巴比妥？

【解答】苯巴比妥与地西洋都有控制惊厥的作用，但是不同疾病，选择不同。

新生儿颅内出血：控制惊厥首选苯巴比妥，还可选用地西洋、水合氯醛等。

新生儿缺血缺氧性脑病：控制惊厥首选苯巴比妥，负荷量为 20mg/kg，于 15~30 分钟静脉滴入，若不能控制惊厥，1 小时后可加用 10mg/kg，12~24 小时后给维持量，每日 3~5mg/kg。

肝功能不全者改用苯妥英钠，顽固性抽搐者加用安定或水合氯醛。

小儿惊厥：控制惊厥①应用抗惊厥药物，首选地西洋静注，每次 0.1~0.3mg/kg，一次总量不超过 10mg，原液可不稀释，注射速度不超过 1~2mg/min，大多 1~2 分钟内生效，但作用短暂，必要时 30 分钟后重复，静注有困难时可保留灌肠，比肌注见效快，5~10 分钟内可见效；另外其他止惊药还有苯妥英钠、苯巴比妥、10%水合氯醛等。

3. 【问题】G₂P₁表示什么意思？

【解答】G 表示怀孕 (gestation)；P 表示分娩、生产的意思 (parturition)。G₂P₁表示孕 2 产 1 的意思。

4. 【问题】完全代偿间歇和不完全代偿间歇是什么意思？

【解答】房性期前收缩常使窦房结提前发生除极，因而包括期前收缩在内前后两个窦性 P 波的间期，短于窦性 PP 间期的两倍，称为不完全性代偿间歇。

少数房性期前收缩发生较晚，或窦房结周围组织的不应期长，窦房结的节律未被扰乱，期前收缩前后 PP 间期恰好为窦性者 2 倍，称为完全性代偿间歇。

5. 【问题】抽混合胰岛素时应该先抽什么再抽什么？为什么？

【解答】普通胰岛素和长效胰岛素混合使用时，如果先抽长效胰岛素，再抽普通胰岛素时，针管内的长效胰岛素可能会混入到普通胰岛素瓶内，从而使普通胰岛素的速效性减弱或丧失。