

(2015) (1~2 题共用题干)

女性, 18 岁, 月经不规律 2 年, 阴道大量流血 2 周, 贫血貌。B 超示子宫及双侧附件未见异常。血 FSH、LH、PRL 水平正常。

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 子宫内膜异位症
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 卵巢功能性肿瘤
- E. 子宫内膜癌

(2015) (1~2 题共用题干)

女性, 18 岁, 月经不规律 2 年, 阴道大量流血 2 周, 贫血貌。B 超示子宫及双侧附件未见异常。血 FSH、LH、PRL 水平正常。

2. 经过治疗止血并撤退性出血后, 首选的治疗是

- A. 雄激素治疗
- B. 雌孕激素序贯疗法
- C. 雌激素治疗
- D. 孕激素治疗
- E. 氯米芬促排卵治疗

(2016) (1~3 题共用题干)

女, 48 岁, G2P2, 月经周期紊乱伴潮热 1 年, 阴道流血 35 天, 伴头晕, 乏力 10 天, 妇科检查见宫颈轻度糜烂, 无触血, 子宫大小形态正常, 双侧附件区未触及异常。超声检查示: 子宫内膜厚 0.8cm, 无血流信号。

1. 对明确诊断最有价值的检查

- A. HPV 检查
- B. 宫颈细胞学检查
- C. 尿妊娠试验
- D. 性激素水平测
- E. 诊断性刮宫

(2016) (1~3 题共用题干)

女, 48 岁, G2P2, 月经周期紊乱伴潮热 1 年, 阴道流血 35 天, 伴头晕, 乏力 10 天, 妇科检查见宫颈轻度糜烂, 无触血, 子宫大小形态正常, 双侧附件区未触及异常。超声检查示: 子宫内膜厚 0.8cm, 无血流信号。

2. 该患者最可能的诊断是

- A. 子宫颈鳞癌
- B. 宫颈上皮内瘤变
- C. 异位妊娠
- D. 功能失调性子宫出血
- E. 子宫内膜炎

(2016) (1~3 题共用题干)

女, 48 岁, G2P2, 月经周期紊乱伴潮热 1 年, 阴道流血 35 天, 伴头晕, 乏力 10 天, 妇科检查见宫颈轻度糜烂, 无触血, 子宫大小形态正常, 双侧附件区未触及异常。超声检查示: 子宫内膜厚 0.8cm, 无血流信号。

3. 若诊断成立, 首选的治疗是

- A. 广泛性子宫切除
- B. 宫颈锥切
- C. 腹腔镜探查术
- D. 抗炎治疗
- E. 激素类药物治疗

(2015) 多囊卵巢综合征的常见月经改变是

- A. 月经周期正常, 经量过少
- B. 月经频发
- C. 月经周期正常, 经量延长
- D. 月经周期正常, 经量过多
- E. 月经稀发

(2019) 关于多囊卵巢综合征的内分泌特征, 错误的是

- A. 雄激素过多
- B. LH/FSH 比值升高

- C. 雌酮过多
- D. 胰岛素过多
- E. 孕酮过多

(2013、2018) (1~2 题共用题干)

女, 28 岁。婚后 4 年未孕, 月经周期 4~5 天/2~3 个月, 量偏少, 身高 156cm, 体重 75kg, 面部可见痤疮, 阴毛分布呈男性型。妇科检查: 子宫未见异常, 双侧卵巢稍大。基础体温单相。

1. 该患者最可能的诊断是
 - A. 生殖器结核
 - B. 卵巢早衰
 - C. 子宫内膜异位症
 - D. 多囊卵巢综合征
 - E. 黄体功能不足

(2013、2018) (1~2 题共用题干)

女, 28 岁。婚后 4 年未孕, 月经周期 4~5 天/2~3 个月, 量偏少, 身高 156cm, 体重 75kg, 面部可见痤疮, 阴毛分布呈男性型。妇科检查: 子宫未见异常, 双侧卵巢稍大。基础体温单相。

2. 该患者用氯米芬的治疗, 最需要注意防止的并发症是
 - A. 卵巢早衰
 - B. 卵巢过度刺激综合征
 - C. 肝肾功能损害
 - D. 盆腔炎性疾病
 - E. 黄素化卵泡不破裂综合征

提分必背——内分泌系统疾病高频考点

功血——下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱, 内外生殖器官无器质性病变

★★★少女无排卵型功血=青春期少女+月经紊乱

基础体温——单相无高温相(不能刮宫!) 上官颖原创总结

治疗: 1. 止血大量雌激素; 2. 调经雌孕激素序贯疗法; 3. 促排卵 (有生育需求)

★★★老太无排卵型功血=围绝经期+月经紊乱 (功血? 子宫内膜癌?)

确诊——诊断性刮宫, 可止血、诊断、送病理以排除癌变

刮宫时间及特点——经前期 1~2 天或月经来潮 6h 内刮宫, 增生期子宫内膜

基础体温——单相无高温相

上官颖原创总结

治疗——诊刮、雄激素、雌孕激素合并疗法、预防内膜癌

★★★黄体功能不足=熟女+月经周期缩短、经期正常、月经频发

确诊——诊断性刮宫, 经前期或月经来潮 6h 内, 子宫内膜为分泌反应不良或分泌反应发育落后 2 天

基础体温——双相体温, 高温相短

上官颖原创总结

★★★黄体萎缩不全=熟女+月经周期正常、月经期延长、经量增多

确诊——诊断性刮宫, 经期第 5、6 天刮到分泌、增生期内膜并存

基础体温——双相体温, 高温相下降缓慢

闭经——沿着子宫卵巢垂体下丘脑, 从下往上找原因

★★★闭经类型及常见疾病

子宫性闭经——Asherman 综合征

上官颖原创总结

卵巢性闭经——卵巢早衰、特纳综合征 (原发性闭经)

垂体性闭经——Sheehan 综合征、空蝶鞍综合征

下丘脑性闭经——最常见, 多为非器质性

★★★不同闭经类型的诊断方法

子宫性闭经——雌孕激素序贯试验 (一)

上官颖原创总结

卵巢性闭经——FSH 测定试验 FSH 大于 40U/L

垂体性闭经——GnRH 刺激/垂体兴奋试验, 垂体无反应

下丘脑性闭经——GnRH 刺激/垂体兴奋试验, 垂体有反应

★★★★高催乳素血症=闭经+泌乳+查血 PRL+治疗首选溴隐亭

多囊卵巢综合征——月经稀发 (不排卵)、高雄激素血症、高胰岛素

★★★多囊卵巢综合症的常见月经改变是月经稀发

★★★多囊诊断公式=育龄期女性+月经稀发/不孕+多毛、痤疮、肥胖

★★★多囊内分泌变化: 胰岛素、雌激素、雄激素均升高, 促性腺激素比例失常 $LH/FSH \geq 2$, 无孕激素升高, 因为患者不排卵

★★★多囊治疗促排卵首选氯米芬, 注意防止出现卵巢过度刺激综合征

★★围绝经期的标志性表现——潮热

★★雌激素水平下的最常见症状是——潮热

上官颖原创总结

★★卵巢功能衰退是绝经前最早出现的变化

★★月经紊乱是绝经过渡期的常见症状

提分, 保命!

八月, 领证!

