

临床助理医师考试:《答疑周刊》2020年第49期

【泌尿系统】

1. 男性, 36岁。1月前右肾疼痛, 近半月肾区胀痛。尿常规, 白细胞2~3个/HP, 红细胞5~10个/HP, 腹部平片可见右输尿管中段高密度阴影10mm, IVU可见右肾轻度积水, 输尿管上段轻度扩张。其理想的治疗方法

- A. 肾切除术
- B. 套石术
- C. 输尿管切开取石
- D. 体外震波碎石
- E. 药物排石

【正确答案】D

【答案解析】体外震波碎石最佳的适应证是肾、输尿管直径小于2cm的肾结石。本例是10mm, 是体外震波碎石的适应证。

2. 下列导致关节痛的疾病中, 休息后症状加重的是

- A. 强直性脊柱炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 多肌炎
- D. 骨关节炎
- E. 痛风

【正确答案】A

【答案解析】强直性脊柱炎起病缓慢, 常累及膝、髋和踝关节, 疼痛与休息后加重。骨关节炎起病缓, 活动后疼痛加重。痛风起病急剧, 疼痛性质剧烈, 尤以夜间为重。系统性红斑狼疮关节痛是常见的症状之一, 出现在指、腕、膝关节, 伴红肿者少见。常出现对称性多关节疼痛, 但疼痛性质无规律。

3. 透析指征

- ①急性肺水肿;
- ②无尿 $\geq 2$ 天或少尿 $\geq 4$ 天;
- ③酸中毒: pH $< 7.25$ 或二氧化碳结合力 $< 12$ mmol/L;
- ④血钾 $\geq 6.5$ mmol/L, 每日上升 $> 1$ mmol/L。

⑤血尿素氮 $\geq 21.4\text{mmol/L}$ , 或每日升高 $\geq 8.9\text{mmol/L}$ 。

⑥血肌酐 $\geq 442\text{ }\mu\text{mol/L}$ , 或每日升高 $\geq 176.8\text{ }\mu\text{mol/L}$ 。

#### 4. 慢性肾脏病分期——K/DOQI 指南

分期	特征	GFR (ml/min · 1.73m <sup>2</sup> )
1	肾损害, GFR 正常或升高	$\geq 90$
2	GFR 轻度下降	60~89
3	GFR 中度下降	30~59
4	GFR 重度下降	15~29
5	ESRD (肾衰竭)	$< 15$

#### 5. 下列哪项不是肾病综合征的主要特征

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 高血糖
- D. 水肿
- E. 高脂血症

【正确答案】 C

【答案解析】 肾病综合征: 大量蛋白尿; 低白蛋白血症; 水肿; 高脂血症。

6. 男, 76 岁, 膀胱右侧后壁有广泛基底乳头状肿瘤, 双合诊扪及一与盆腔侧壁固定的包块, 应采用

- A. 膀胱部分切除术
- B. 膀胱肿瘤局部切除术
- C. 根治性膀胱全切除术
- D. 经膀胱镜肿瘤切除术
- E. 姑息性放疗及化疗

【正确答案】 E

【答案解析】 与盆腔侧壁固定的包块说明累及盆腔周围组织, 提示转移。对于已有转移的膀胱癌以化疗为主。

7. 女, 26 岁。患左肾结核性脓肾, 右肾积水, 血 Cr  $60\text{ }\mu\text{mol/L}$ , 如何治疗

- A. 左肾切除术

- B. 右肾造口术
- C. 抗结核保守治疗
- D. 输尿管腹壁造口术
- E. 膀胱造瘘术

【正确答案】A

【答案解析】血Cr  $60 \mu\text{mol/L}$ ，在正常范围之内，所以肾功能是正常的。并且右肾积水也是因为左肾结核引起的，左肾切除后右肾功能会好转的。故不用先右肾消除积水。肾切除术：破坏范围较大的单侧肾结核，单侧结核性脓肾、钙化肾、如对侧肾功能良好，均适应肾切除术。两侧肾结核，一侧破坏严重、肾功亏损而另侧病变较轻，足以代偿时，应在抗结核药物配合下切除重侧病肾。