



微信公众号



医学网微信群



医学网APP

2021年中西医执业/助理医师精编模考试卷

一、A1

1. 急性心梗患者常有发热，其主要机制是
 - A. 变态反应
 - B. 代谢障碍
 - C. 体温调节中枢失常
 - D. 神经功能障碍
 - E. 无菌性坏死物质的吸收
2. 下列关于劣药的情形叙述正确的是
 - A. 超过有效期的药品
 - B. 不注明或者更改生产批号的药品
 - C. 未标明有效期或者更改有效期的药品
 - D. 被污染的药品
 - E. 以上均是
3. 主动脉瓣第二听诊区适合听诊
 - A. 收缩期杂音
 - B. 舒张期杂音
 - C. 连续性杂音
 - D. 第一心音分裂
 - E. 第二心音分裂
4. 药物中毒抢救，试验发现当酸化尿液时，药物肾清除率小于肾小球滤过率，碱化尿液时则相反，该药物是
 - A. 强碱性
 - B. 弱碱性
 - C. 弱酸性
 - D. 强酸性
 - E. 非解离型
5. 母婴传播不包括
 - A. 血液传播
 - B. 哺乳传播
 - C. 上行性传播
 - D. 经胎盘传播
 - E. 分娩引起的传播

6. 治疗普通型流行性脑脊髓膜炎首选抗菌药物是

- A. 氨苄西林
- B. 青霉素
- C. 红霉素
- D. 磺胺药
- E. 庆大霉素

7. 左金丸中黄连与吴茱萸的用量比例为

- A. 3:1
- B. 3:2
- C. 4:1
- D. 5:1
- E. 6:1

8. 伤寒患者可见的面容为

- A. 急性热病容
- B. 慢性病容
- C. 无欲貌
- D. 水肿面容
- E. 面具面容

9. 右房肥大的心电图表现为

- A. P波低平
- B. P波增宽
- C. P波呈双峰状
- D. P波尖而高耸
- E. P波出现切迹

10. 痰液呈铁锈色痰多见于

- A. 肺脓肿
- B. 肺结核
- C. 支气管扩张
- D. 绿脓杆菌感染
- E. 肺炎链球菌肺炎

11. 构成传染病流行过程的三个基本条件是

- A. 季节、地区、暴发
- B. 侵袭力、数量、外环境
- C. 病原体、机体、外环境
- D. 社会因素、变异性、毒力
- E. 传染源、传播途径、易感人群

12. 我国最常见的咯血原因是

- A. 肺结核
- B. 肺梗塞
- C. 右心衰竭
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 风湿性心脏病

13. 腹痛伴呕吐大量隔夜宿食，多见于

- A. 慢性胃炎



B. 空肠梗阻

C. 幽门梗阻

D. 低位肠梗阻

E. 消化性溃疡

14. 手太阴肺经的起止穴是

A. 少商、中府

B. 中府、少商

C. 商阳、中府

D. 中府、商阳

E. 商阳、迎香

15. 高钾血症是指血清钾浓度

A. >3.5mmol/L

B. >4.0mmol/L

C. >4.5mmol/L

D. >5.0mmol/L

E. >5.5mmol/L

16. 原发性肺癌最多见的是

A. 小细胞肺癌

B. 鳞状上皮细胞癌

C. 腺癌

D. 大细胞癌

E. 鳞腺癌

17. 慢性左心衰竭所表现的临床特征主要是由于

A. 肺动脉压力增高所致

B. 肺充血、肺水肿所致

C. 体循环静脉压力增高所致

D. 左心室舒张末期压力增高所致

E. 心排血量降低，周围器官供血不足所致

18. 治疗尿路感染之膀胱湿热证，首选的方剂是

A. 八正散

B. 石韦散

C. 无比山药丸

D. 丹栀逍遥散

E. 龙胆泻肝汤

19. 脑栓塞心源性栓子的来源最多见的直接原因是

A. 风心病

B. 慢性房颤

C. 心肌梗死

D. 感染性心内膜炎

E. 动脉粥样硬化

20. 肝胆湿热证的胁痛，治疗首选方剂是

A. 龙胆泻肝汤

B. 一贯煎

C. 小承气汤



- D. 大承气汤
E. 甘露消毒丹
21. 郁证之气郁化火证选用的方剂是
A. 柴胡疏肝散
B. 丹栀逍遥散
C. 知柏地黄丸
D. 半夏厚朴汤
E. 龙胆泻肝汤
22. 温脾汤的功效是
A. 润肠泄热，行气通便
B. 清胆利湿，和胃化痰
C. 攻下寒积，温补脾阳
D. 透邪解郁，疏肝理脾
E. 养血安神，清热除烦
23. 下列方剂中，功效具有清营解毒，透热养阴的是
A. 清营汤
B. 黄连解毒汤
C. 犀角地黄汤
D. 仙方活命饮
E. 龙胆泻肝汤
24. 患者久病面色晦暗无华，突然两颧泛红如妆属
A. 得神
B. 少神
C. 失神
D. 假神
E. 神乱
25. 下列何药为利水消肿之要药
A. 茯苓
B. 泽泻
C. 猪苓
D. 薏苡仁
E. 车前子
26. 气性坏疽首选的治疗药物是
A. 青霉素
B. 氯霉素
C. 链霉素
D. 肾上腺素
E. 去甲肾上腺素
27. 治疗红丝疔，应首选的方剂是
A. 银翘散
B. 牛蒡解肌汤
C. 仙方活命饮
D. 柴胡清肝汤
E. 五味消毒饮

28. 原发性肝癌之肝肾阴虚证，首选的治疗方剂是

- A. 四君子汤和逍遥散
- B. 小柴胡汤合大黄䗪虫丸
- C. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- D. 失笑散合膈下逐瘀汤
- E. 青蒿鳖甲汤合一贯煎

29. 治疗肝肾亏损型痛经，首选的方剂为

- A. 调肝汤
- B. 温经汤
- C. 归肾丸
- D. 清热调血汤
- E. 人参养营汤

30. 下列各项疾病中，可将气管拉向患侧的是

- A. 肺硬化
- B. 胸腔积液
- C. 气胸
- D. 纵隔肿瘤
- E. 单侧甲状腺肿大

31. 治疗小儿遗尿肺脾气虚证的首选方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 菟丝子散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 交泰丸合导赤散
- E. 补中益气汤合缩泉丸

32. 治疗小儿肺炎痰热闭肺证的首选方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 人参五味子汤
- C. 银翘散合麻杏石甘汤
- D. 黄连解毒汤合三拗汤
- E. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤

33. 治疗湿热下注型子宫脱垂，首选的方剂为

- A. 大补元煎
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 普济消毒饮
- E. 草薢渗湿汤

34. 中医上将未嫁女性的阴道口和处女膜称为

- A. 阴户
- B. 产户
- C. 龙门
- D. 胞门
- E. 玉门

35. 产后关节痛的血瘀证首选治疗的方剂是

- A. 生化汤



- B. 八珍汤
C. 血府逐瘀汤
D. 少腹逐瘀汤
E. 黄芪桂枝五物汤
36. 治疗多囊卵巢综合征气滞血瘀证首选方为
A. 龙胆泻肝汤
B. 苍附导痰丸
C. 血府逐瘀汤
D. 膈下逐瘀汤
E. 少腹逐瘀汤
37. 麻疹皮疹最先消退的部位是
A. 四肢
B. 胸腹
C. 头颈
D. 鼻准
E. 耳后发际
38. 治疗急惊风的首选药物是
A. 地西洋
B. 苯巴比妥
C. 苯妥英钠
D. 地塞米松
E. 肾上腺素
39. 下列有关寒证的临床表现中，错误的是
A. 畏寒喜暖
B. 小便清长
C. 口渴喜饮
D. 大便稀薄
E. 舌淡苔白
40. 肝源性水肿常见于
A. 肝硬化
B. 各型肾炎
C. 右心衰竭
D. 低蛋白血症
E. 妊娠高血压综合征
41. 临床中最典型、最常见的腔隙综合征是
A. 纯运动性轻偏瘫
B. 纯感觉性卒中
C. 共济失调性轻偏瘫
D. 构音障碍-手笨拙综合征
E. 感觉运动性卒中
42. 阴中求阳的治法适用于
A. 阳盛
B. 阴阳两虚
C. 阴虚

D. 阳虚

E. 阴盛

43. 气的升之太过或降之不及的病理变化为

A. 气滞

B. 气逆

C. 气陷

D. 气闭

E. 气脱

44. 津液的丢失往往伴有气的损耗，说明二者的关系是

A. 气能行津

B. 气能摄津

C. 气能生津

D. 津能生气

E. 津能载气

45. 八纲辩证的总纲是

A. 气血

B. 阴阳

C. 寒热

D. 表里

E. 虚实

46. 治疗血瘀经闭，癥瘕积聚，应选用的药物是

A. 酸枣仁

B. 石菖蒲

C. 僵蚕

D. 麝香

E. 冰片

47. 下列各项，不属于麻黄的功用的是

A. 解表

B. 发汗

C. 解肌

D. 平喘

E. 宣肺

48. 藿香正气散组成中含有的药物是

A. 猪苓、白芷

B. 苍术、半夏

C. 半夏、人参

D. 桔梗、山药

E. 白术、陈皮

49. 有机磷中毒时，阿托品必须与什么药合用

A. 毛果芸香碱

B. 氯磷定

C. 新斯的明

D. 匹鲁卡品

E. 肾上腺素

50. 下列关于美托洛尔临床应用，错误的是

- A. 室上性心律失常
- B. 焦虑引起的窦性心动过速
- C. 室性心律失常
- D. 急性心肌梗死
- E. 阻滞心脏 β_2 受体发挥抗心律失常作用

二、A2

51. 患者，女性，41岁。三天前出现较剧烈的心前区疼痛，伴有发热，呼吸和咳嗽时加重，有心包摩擦音；心电图除 aVR 外，其余导联均有 ST 段弓背向下的抬高，T 波倒置，无异常 Q 波出现。应诊断为

- A. 急性胃穿孔
- B. 消化性溃疡
- C. 心肌梗死
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性心包炎

52. 患者，女性，48岁。症见：腰痛隐隐，以酸软为主，喜揉喜按，腿膝无力，遇劳更甚，卧则减轻，常反复发作，心烦失眠，口燥咽干，面色潮红，手足心热，舌红少苔，脉弦细数。其治疗首选方剂为

- A. 右归丸
- B. 左归丸
- C. 金匮肾气丸
- D. 六味地黄丸
- E. 知柏地黄丸

53. 患者女，28岁，未婚。近3个月，因大怒后，每逢月经期即月经提前，量或多或少，色深红或紫红，质稠有块，经行不畅，乳房或少腹胀痛，胸胁胀满，口苦咽干；舌红，苔薄黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 丹栀逍遥散
- B. 凉膈散
- C. 清肝引经汤
- D. 顺经汤
- E. 桃红四物汤

54. 患者，男，30岁，煤气中毒，经过积极抢救后苏醒，2天后又出现神志不清，右侧肢体偏瘫，体温、血压正常，两肺呼吸音粗。进一步治疗首选为

- A. 维生素 E 输注
- B. 脑营养物质
- C. 高压氧舱
- D. 地塞米松输注
- E. 甘露醇输注

55. 患者，男，29岁，被诊断为慢性肾小球肾炎。现症颜面浮肿，疲倦乏力，少语懒言，自汗出，易感冒，腰脊酸痛，面色萎黄，舌淡，苔白，脉细弱。首选治法为

- A. 疏风解表
- B. 补益肺肾
- C. 补气健脾益肾

- D. 清热利水消肿
E. 益气养阴
56. 患者，男，汽油烧伤前臂，表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红白相间，痛觉迟钝。烧伤深度为
A. I°
B. 浅 II°
C. 深 II°
D. III°
E. IV°
57. 患者，男，56岁。近来出现阵发性心动过速，心悸、胸闷、头晕、乏力、胸痛。查体：心率为170次/分，律规则。最可能的诊断是
A. 窦性心动过速
B. 阵发性房性心动过速伴2:1房室传导
C. 心房扑动，2:1房室传导
D. 阵发性室上性心动过速
E. 阵发性室性心动过速
58. 女性，46岁。血压160/95mmHg以上，头晕耳鸣，目涩，咽干，五心烦热，盗汗，不寐多梦，腰膝酸软，大便干涩，小便热赤，舌质红少苔，脉细数，选用的治法为
A. 平肝潜阳
B. 祛痰降浊
C. 活血化瘀
D. 温补肾阳
E. 滋补肝肾，平潜肝阳
59. 患者泄泻清稀，甚者如水样，腹痛肠鸣，脘闷纳少，苔薄白或白腻，脉濡缓。其中医诊断及辨证为
A. 泄泻寒湿内盛证
B. 泄泻湿热伤中证
C. 泄泻食滞肠胃证
D. 泄泻脾胃虚弱证
E. 泄泻肾阳虚衰证
60. 患者胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，甚至神志淡漠或突然昏厥，舌质青紫，脉微欲绝。西医诊断为心肌梗死，治疗应首选
A. 理中丸
B. 肾气丸
C. 四逆散
D. 当归四逆汤
E. 参附龙牡汤
61. 患者，男，30岁，西医诊断为溃疡性结肠炎，症见大便秘结或少量脓血便，腹痛隐隐，午后发热，盗汗，五心烦热，头晕眼花，舌红少苔，脉细数。应选用的方药是
A. 痛泻要方
B. 驻车丸



C. 参苓白术散

D. 四神丸

E. 白头翁汤

62. 韩某，男，68岁。肺心病多年，症见呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，痰白清稀如沫，胸闷，心慌形寒，汗出，舌淡，脉沉细微无力。治疗宜选

A. 苏子降气汤

B. 生脉散合血府逐瘀汤

C. 补肺汤

D. 涤痰汤

E. 小青龙汤

三、B

A. 毛果芸香碱

B. 新斯的明

C. 阿托品

D. 度冷丁

E. 吗啡

63. 可用于治疗青光眼的是

64. 可用于阵发性室上性心动过速的是

A. 心与肺

B. 心与脾

C. 心与肝

D. 心与肾

E. 肝与肾

65. 主要体现为气与血关系的是

66. 主要表现在血液方面关系的是

A. 四物汤

B. 归脾汤

C. 养心汤

D. 当归六黄汤

E. 桂枝加黄芪汤

67. 治疗盗汗之心血不足证，首选方剂是

68. 治疗盗汗之阴虚火旺证，首选方剂是

A. 和解少阳，内泻热结

B. 理气化湿，和解少阳

C. 祛湿化浊，和中止泻

D. 清热化湿，和中止泻

E. 温中补虚，和里缓急

69. 小建中汤的功用是

70. 大柴胡汤的功用是

A. 匙状甲

B. 杵状指

C. 膝内翻

D. 足内翻

- E. 膝关节变形
71. 缺铁性贫血可出现的表现是
72. 风湿性关节炎活动期可出现的表现是
- A. 驻车丸
- B. 理中汤合四神丸
- C. 白头翁汤
- D. 痛泻要方
- E. 参苓白术散
73. 治疗脾肾阳虚型溃疡性结肠炎首选方剂是
74. 治疗肝郁脾虚型溃疡性结肠炎的首选方剂是
- A. 风池、百会、内关、太冲
- B. 百会、行间、侠溪、太冲
- C. 风池、气海、脾俞、胃俞
- D. 风池、太溪、悬钟、三阴交
- E. 风池、百会、肝俞、肾俞、足三里
75. 治疗眩晕实证，应选取
76. 治疗眩晕虚证，应选取
- A. 巍顶痛
- B. 头痛连齿
- C. 后头部连项痛
- D. 前额部连眉棱骨痛
- E. 痛在两侧太阳穴附近为甚
77. 太阳经头痛的表现是
78. 少阴经头痛的表现是
- A. 消食兼能发表
- B. 消食兼能散瘀
- C. 消食兼能止遗
- D. 消食兼能回乳
- E. 消食兼能化痰
79. 山楂具有的功效特点为
80. 麦芽具有的功效特点为
- A. 附子理中汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 十全大补汤
- D. 参苓白术散合二陈汤
- E. 失笑散合膈下逐瘀汤
81. 脾虚痰湿型胃癌的首选方剂是
82. 瘀毒内阻型胃癌的首选方剂是
- A. 血液传播
- B. 唾液传播
- C. 飞沫传播
- D. 蚊虫传播
- E. 食物传播
83. 乙型肝炎的主要传播途径是

84. 戊型肝炎的主要传播途径是
A. 温肾健脾，化气行水
B. 养阴健脾，利水化湿
C. 益气养阴，化湿清热
D. 益气健脾，宣肺利水
E. 滋阴补肾，平肝潜阳
85. 小儿肾病综合征肝肾阴虚证的治法为
86. 小儿肾病综合征脾肾阳虚证的治法为
A. 脘前上棘水平腹直肌外缘
B. 第 12 肋与腰肌外缘交角的顶点
C. 右侧腹直肌外缘与肋弓交界处
D. 脐与髂前上棘连线的中外 1/3 交界处
E. 脐水平线上腹直肌外缘
87. 胆囊点位于
88. 上输尿管压痛点位于
A. 右肺不张
B. 肺气肿
C. 胃肠胀气
D. 急性肝炎
E. 急性胃肠穿孔
89. 肝浊音界消失见于
90. 肝浊音界上移见于
A. 奇脉
B. 水冲脉
C. 交替脉
D. 枪击音
E. 杜氏双重杂音
91. 吸停脉是指
92. 听诊与心跳一致的“嗒嗒”音是指
A. 真热假寒证
B. 真寒假热证
C. 真实假虚证
D. 真虚假实证
E. 表里同病证
93. 古代有阳盛格阴证之称的是
94. 古代有阴盛格阳证之称的是
A. HBsAg
B. 抗-HBs
C. HBcAg
D. HBVDNA
E. 抗-HBe
95. HBV 存在和复制最可靠的直接证据是
96. 病毒复制减少，传染性减弱的标志物是
A. 喹咤嗪





- B. 利血平
 - C. 硝苯地平
 - D. 氢氯噻嗪
 - E. β 受体阻断剂
97. 高血压伴血浆肾素活性增高者宜选用
- 98. 心性水肿首选
 - A. 二甲双胍
 - B. 氯磺丙脲
 - C. 格列齐特
 - D. 格列吡嗪
 - E. 甲苯磺丁脲
99. 促进ADH分泌的药物
100. 易引起乳酸血症的药物



微信公众号



医学网微信群



医学网APP

2021年中西医执业/助理医师精编模考试卷答案与解析

一、A1

1. 【正确答案】E

【答案解析】无菌性坏死物质的吸收所致的发热有大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。所以说急性心梗患者发热的主要机制是由于无菌性坏死物质的吸收所造成的。

2. 【正确答案】E

【答案解析】有下列情形之一的，为劣药：

1. 药品成分的含量不符合国家药品标准；
2. 被污染的药品；
3. 未标明或者更改有效期的药品；
4. 未注明或者更改产品批号的药品；
5. 超过有效期的药品；
6. 擅自添加防腐剂、辅料的药品；
7. 其他不符合药品标准的药品。

3. 【正确答案】B

【答案解析】主动脉瓣第二听诊区位于胸骨左缘第3、4肋间隙，主动脉瓣关闭不全时的舒张期杂音在此区最响。

4. 【正确答案】C

【答案解析】肾脏的重吸收作用主要决定于肾小球滤过，尿液pH值将影响药物解离度，从而影响排泄。当弱酸性药物中毒时，碱化尿液可使药物的重吸收减少，排泄增加，从而解救药物中毒。

5. 【正确答案】A

【答案解析】母婴传播包括：①经胎盘传播；②上行性传播；③分娩引起的传播；④哺乳传播等。

6. 【正确答案】B

【答案解析】流行性脑脊髓膜炎抗生素治疗原则：青霉素为首选药，较大剂量青霉素能使脑脊液内药物达到有效浓度。

7. 【正确答案】E

【答案解析】左金丸组成：黄连六两、吴茱萸一两，可记住口诀“左金连萸六比一”。

8. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒面容可见表情淡漠，反应迟钝，呈无欲状态。见于伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰弱患者。

9. 【正确答案】D

【答案解析】右房肥大心电图表现为P波高尖，其幅度 $\geq 0.25mV$ ，以Ⅱ、Ⅲ、aVF导联表现最为突出，常见于慢性肺源性心脏病，故称“肺型P波”，也可见于某些先天性心脏病。

10. 【正确答案】E

【答案解析】痰液颜色：铁锈色痰：见于肺炎链球菌肺炎。

11. 【正确答案】E

【答案解析】传染病的流行过程就是传染病在人群中发生、发展和转归的过程。流行过程的构成需要有三个基本条件，包括传染源、传播途径和易感人群。同时流行过程又受到社会因素和自然因素的影响。

12. 【正确答案】A

【答案解析】肺结核为我国最常见的咯血原因。

13. 【正确答案】C

【答案解析】腹痛伴腹胀、呕吐隔餐或隔日食物，见于幽门梗阻；伴腹胀、呕吐、停止排便排气，提示肠梗阻。

14. 【正确答案】B

【答案解析】手太阴肺经起于中府，止于少商。

15. 【正确答案】E

【答案解析】血清钾浓度 $>5.5\text{mmol/L}$ 称高钾血症。

16. 【正确答案】B

【答案解析】鳞状上皮细胞癌（简称鳞癌）：为最常见的类型，多见于老年男性，多有吸烟史，以中央型肺癌多见。

17. 【正确答案】E

【答案解析】慢性左心衰以肺淤血及心排血量降低致器官低灌注表现为主。

18. 【正确答案】A

【答案解析】尿路感染膀胱湿热证

证候：小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，或腰痛拒按，或见恶寒发热，或见口苦，大便秘结，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿通淋。

方药：八正散加减。

19. 【正确答案】B

【答案解析】脑栓塞心源性栓子最常见的直接原因是慢性心房纤颤，造成心房附壁血栓脱落，约占心源性栓子的半数以上。

20. 【正确答案】A

【答案解析】胁痛之肝胆湿热证治宜清利湿热，选用龙胆泻肝汤加减。

21. 【正确答案】B

【答案解析】郁证之气郁化火证治宜疏肝解郁、清肝泻火，选用丹栀逍遥散加减。

22. 【正确答案】C

【答案解析】温脾汤的功用：攻下寒积，温补脾阳。

23. 【正确答案】A

【答案解析】清营汤的功用：清营解毒，透热养阴。

24. 【正确答案】D

【答案解析】假神是指久病、重病患者，精气本已极度衰竭，而突然一时间出现某些神气暂时“好转”的虚假表现。

假神的临床表现：久病、重病患者本已失神，突然精神转佳，神志清楚；或目无光彩，突然目光转亮；或久病面色无华，突然两颧泛红如妆；久病懒言少语，却突然言语不休，想见亲人，或久病本无食欲，而突然欲进饮食或食量突然增加等。

25. 【正确答案】A

【答案解析】茯苓的应用：

- (1) 水肿。药性平和，即可祛邪，又可扶正，利水而不伤正气，为利水消肿之要药。
- (2) 痰饮。
- (3) 脾虚泄泻。尤宜于脾虚湿盛泄泻。
- (4) 心悸，失眠。

26. 【正确答案】A

【答案解析】气性坏疽的西医治疗：

- (1) 急症清创。
- (2) 应用抗生素，首选青霉素。
- (3) 高压氧治疗。
- (4) 全身支持疗法。

27. 【正确答案】E

【答案解析】红丝疔证候：多发于下肢；红丝较细，红肿疼痛，全身症状较轻；重者属火毒入营，可见红丝粗肿明显，迅速向近端蔓延，伴畏寒、发热、头痛等；舌红，苔薄黄，脉数。

治法：清热解毒。

方药：五味消毒饮加减。

28. 【正确答案】E

【答案解析】原发性肝癌之肝肾阴虚证

证候：相当于硬化型Ⅲ期。症见口干，低热盗汗，形体消瘦，腰痛酸软，小便短赤；舌红少苔，脉细数。

治法：养阴散结，凉血解毒。

方药：青蒿鳖甲汤合一贯煎加减。

29. 【正确答案】A

【答案解析】痛经之肝肾亏损证

证候：经期或经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。

治法：滋肾养肝，调经止痛。

方药：调肝汤加减。

30. 【正确答案】A

【答案解析】正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连等，可将气管拉向患侧。

31. 【正确答案】E

【答案解析】小儿遗尿之肺脾气虚证

证候：睡中遗尿，尿频量多，面色无华，神疲乏力，少气懒言，食欲不振，大便

塘薄，自汗出，易感冒，舌淡，苔薄白，脉缓弱。

治法：补肺健脾，固涩止遗。

方药：补中益气汤合缩泉丸加减。

32. 【正确答案】E

【答案解析】小儿肺炎之痰热闭肺证。

证候：发热烦躁，咳嗽喘促，呼吸困难，气急鼻扇，喉间痰鸣，口唇紫绀，面赤口渴，胸闷胀满，泛吐痰涎，舌质红，舌苔黄腻，脉象弦滑。

治法：清热涤痰，开肺定喘。

方药：五虎汤合葶苈大枣泻肺汤加减。

33. 【正确答案】B

【答案解析】子宫脱垂之湿热下注证，证候：阴中有物脱出，表面红肿疼痛，甚或溃烂流液，色黄气秽；舌质红，苔黄腻，脉弦数。治法：清热利湿。方药：龙胆泻肝汤合五味消毒饮。

34. 【正确答案】E

【答案解析】中医古籍中将外阴称之为阴户，又名四边、产户；将阴毛称为毛际；将阴道口和处女膜称为玉门（未嫁）、龙门（未产）、胞门（已产）。

35. 【正确答案】A

【答案解析】产后关节痛之血瘀证

证候：产后遍身疼痛，或关节刺痛，按之痛甚，恶露量少色黯，小腹疼痛拒按；舌紫黯，脉涩。

治法：养血活络，行瘀止痛。

方药：生化汤。

36. 【正确答案】D

【答案解析】多囊卵巢综合征之气滞血瘀证

证候：月经延后，量少不畅，经行腹痛拒按，甚或经闭，婚后不孕，精神抑郁，胸胁胀满，面额痤疮，性毛较浓，或颈项、腋下、腹股沟等处色素沉着；舌紫暗，或边尖有瘀点，脉沉弦或沉涩。

治法：行气活血，祛瘀通经。

方药：膈下逐瘀汤。

37. 【正确答案】E

【答案解析】麻疹出疹3~4天后，皮疹按出疹的先后顺序依次消退，皮疹先见于耳后、发际、渐次延及头面、颈部，自上而下至胸、腹、背四肢，最后在手心、足心及鼻准部见疹点，疹点色泽红活，分布均匀，疹点多在3天内透发完毕。故此题的最佳选项是E。

38. 【正确答案】A

【答案解析】地西洋是治疗急惊风首选的药物。故根据题干要求，此题的正确选项是A。

39. 【正确答案】C

【答案解析】寒证常见的临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰、涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏，面色白，舌淡，苔白而润，脉紧或迟等。选项C属于热证的临床表现。

40. 【正确答案】A

【答案解析】肝源性水肿：肝源性水肿见于肝硬化、重症肝炎等。

41. 【正确答案】A

【答案解析】纯运动性轻偏瘫（PMH）是临床中最典型、最常见的腔隙综合征，约占 60%。

42. 【正确答案】D

【答案解析】对于阴阳偏衰的虚热及虚寒证的治疗，补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳，补阴时适当佐以补阳药谓之阳中求阴。阴中求阳，适用于阳虚，补阳为主，兼以补阴。

43. 【正确答案】B

【答案解析】气逆：指气升之太过，或降之不及，以致气逆于上的一种病理状态。气逆，多因情志所伤，或饮食不当，或外邪侵犯，或痰浊壅阻所致，亦可因虚而无力下降导致气机上逆者。气逆多见于肺、肝、胃等脏腑。

44. 【正确答案】E

【答案解析】津液是气运行的载体之一。在血脉之外，气的运行必须依附于津液，否则也会使气漂浮失散而无所归，故说津能载气。因此，津液的丢失，必定导致气的损耗。

45. 【正确答案】B

【答案解析】在八纲辨证中，表证、热证、实证属阳；里证、寒证、虚证属阴。阴阳是八纲辨证的总纲。

46. 【正确答案】D

【答案解析】麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛，可用于用于血瘀经闭，癥瘕积聚，心腹暴痛，头痛，跌打损伤，风寒湿痹。

47. 【正确答案】C

【答案解析】麻黄的功用是发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

48. 【正确答案】E

【答案解析】藿香正气散

组成：大腹皮、白芷、紫苏、茯苓、半夏曲、白术、陈皮、厚朴、桔梗、藿香、炙甘草、姜、枣。

方歌：藿香正气腹皮苏，甘桔陈苓朴白术，夏曲白芷加姜枣，风寒暑湿并能除。

49. 【正确答案】B

【答案解析】有机磷中毒时，单用阿托品抢救，对 N_2 受体无效，不能制止骨骼肌震颤，须与胆碱酯酶复活剂合用。胆碱酯酶复活药是一类能使已被有机磷酯类抑制的胆碱酯酶恢复活性的药物，常用的有氯磷定（首选）和碘解磷定。

50. 【正确答案】E

【答案解析】美托洛尔通过阻滞心脏的 β 1 受体而发挥抗心律失常作用。

二、A2

51. 【正确答案】E

【答案解析】此题是对急性心包炎的考查。急性心包炎：可有较剧烈而持久的心前区疼痛。疼痛与发热同时出现，呼吸和咳嗽时加重，早期即有心包摩擦音，后者和疼痛在心包腔出现渗液时均消失；心电图除 aVR 外，其余导联均有 ST 段弓背向下的抬高，T 波倒置，无异常 Q 波出现。

52. 【正确答案】B

【答案解析】该患者为偏阴虚之肾虚腰痛，偏阴虚者，治宜滋补肾阴，以左归丸为主方。

53. 【正确答案】A

【答案解析】此患者近 3 个月，每逢月经期即月经提前，当诊断为月经提前。

肝郁血热证

证候：月经提前，量或多或少，色深红或紫红，质稠有块，经行不畅，乳房或少腹胀痛，胸胁胀满，口苦咽干；舌红，苔薄黄，脉弦数。

治法：疏肝解郁，清热调经。
方药：丹栀逍遥散。

54.【正确答案】C

【答案解析】高压氧下，可加速 COHb 解离，既可迅速纠正组织缺氧，又可加速 CO 的清除。高压氧治疗 CO 中毒可缩短病程，降低病死率；且可减少迟发性脑病的发生。

55.【正确答案】B

【答案解析】慢性肾小球肾炎之肺肾气虚证

证候：颜面浮肿或肢体肿胀，疲倦乏力，少语懒言，自汗出，易感冒，腰脊酸痛，面色萎黄，舌淡，苔白，脉细弱。

治法：补益肺肾。

方药：玉屏风散合金匮肾气丸加减

56.【正确答案】C

【答案解析】深Ⅱ°烧伤：伤及皮肤的真皮层，介于浅Ⅱ°和Ⅲ°之间，也可有水疱，但去疱皮后创面微湿，红白相间，痛觉较迟钝。

57.【正确答案】D

【答案解析】阵发性室上性心动过速呈阵发性，心率在 160 次/分以上，感心悸、胸闷、头晕、乏力、胸痛或紧压感。持续时间长者，可发生血流动力学障碍，表现为面色苍白、四肢厥冷、血压降低，偶可晕厥等。

58.【正确答案】E

【答案解析】该患者为原发性高血压肝肾阴虚证

证候：头晕耳鸣，目涩，咽干，五心烦热，盗汗，不寐多梦，腰膝酸软，大便干涩，小便热赤，舌质红少苔，脉细数或弦细。

治法：滋补肝肾，平潜肝阳。

方药：杞菊地黄丸加减。

59.【正确答案】A

【答案解析】泄泻寒湿内盛证

证候：泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，或兼外感风寒，则恶寒，发热，头痛，肢体酸痛，舌苔白或白腻，脉濡缓。

治法：芳香化湿，解表散寒。

方药：藿香正气散加减。

60.【正确答案】E

【答案解析】心肌梗死之心阳欲脱证

证候：胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，甚至神志淡漠或突然昏厥，舌质青紫，脉微欲绝。

治法：回阳救逆，益气固脱。

方药：参附龙牡汤加减。

61.【正确答案】B

【答案解析】溃疡性结肠炎——阴血亏虚证

证候：大便秘结或少量脓血便，腹痛隐隐，午后发热，盗汗，五心烦热，头晕眼花，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴养血，清热化湿。

方药：驻车丸

62. 【正确答案】C

【答案解析】肺心病肺肾气虚证

证候：呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，痰白清稀如沫，胸闷，心慌形寒，汗出，舌淡或暗紫，脉沉细微无力，或有结代。

治法：补肺纳肾，降气平喘。

方药：补肺汤加减。

63. 【正确答案】A

【答案解析】毛果芸香碱能够缩瞳、降低眼压，用于青光眼的治疗。青光眼分闭角型和开角型。闭角型青光眼因前房角狭窄，房水回流受阻而使眼内压升高，毛果芸香碱可使前房角间隙扩大，房水回流通畅，眼内压降低；开角型青光眼因小梁网本身及巩膜静脉窦发生变性或硬化，阻碍了房水循环，引起眼内压升高，毛果芸香碱可能通过扩张巩膜静脉窦周围的小血管及收缩睫状肌，使小梁网结构发生改变而使眼内压下降。

64. 【正确答案】B

【答案解析】新斯的明通过拟胆碱作用使心室频率减慢，用于治疗压迫眼球或颈动脉窦等兴奋迷走神经措施无效时的阵发性室上性心动过速。

65. 【正确答案】A

【答案解析】心肺同居上焦，心主血而肺主气，心主行血而肺主呼吸。心与肺的关系，主要表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协调关系。心肺相互协调，则保证气血正常运行，维持机体各脏腑组织的新陈代谢。故本题答案选 A。

66. 【正确答案】B

【答案解析】心主血而行血，脾主生血又统血，所以心与脾的关系，主要是主血与生血、行血与统血的关系。

67. 【正确答案】B

【答案解析】盗汗——心血不足

证候：睡则汗出，醒则自止，心悸怔忡，失眠多梦，或兼眩晕健忘，气短神疲，面色少华或萎黄，口唇色淡，舌质淡，苔薄，脉虚或细。

治法：补血养心。

方药：归脾汤加减。

68. 【正确答案】D

【答案解析】阴虚火旺证

证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

方药：当归六黄汤加减。

69. 【正确答案】E

【答案解析】小建中汤的功用：温中补虚，和里缓急。

70. 【正确答案】A

【答案解析】大柴胡汤的功用：和解少阳，内泻热结。

71. 【正确答案】A

【答案解析】匙状甲（反甲）：常见于缺铁性贫血，偶见于风湿热。

72. 【正确答案】E

【答案解析】膝关节变形：常见于风湿性关节炎活动期、结核性关节炎。

73. 【正确答案】B

【答案解析】溃疡性结肠炎之脾肾阳虚证

证候：腹泻迁延日久，腹痛喜温喜按，腹胀，腰酸膝软，食少，形寒肢冷，神疲懒言，舌质淡或有齿痕，苔白润，脉沉细或尺弱。

治法：健脾温肾止泻。

方药：四神丸加味。

74. 【正确答案】D

【答案解析】溃疡性结肠炎之肝郁脾虚证

证候：腹泻前有情绪紧张或抑郁恼怒等诱因，腹痛即泻，泻后痛减，食少，胸胁胀痛，嗳气，神疲懒言，舌质淡，苔白，脉弦或弦细。

治法：疏肝健脾。

方药：痛泻要方加味。

75. 【正确答案】A

【答案解析】眩晕实证的处方。主穴：百会、风池、太冲、内关。

76. 【正确答案】E

【答案解析】眩晕虚证的处方。主穴：百会、风池、肝俞、肾俞、足三里。

77. 【正确答案】C

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。

78. 【正确答案】B

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。

79. 【正确答案】B

【答案解析】山楂功效：消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。

80. 【正确答案】D

【答案解析】麦芽功效：行气消食，健脾开胃，回乳。

81. 【正确答案】D

【答案解析】胃癌之脾虚痰湿证

证候：多见于中、晚期胃癌合并贲门或幽门梗阻者。头晕身重，呕吐痰涎，胃脘痞满疼痛；口淡少食，腹胀便溏，痰核累累；舌淡胖苔浊，脉濡滑。

治法：健脾化湿，软坚散结。

方药：参苓白术散合二陈汤加减。

82. 【正确答案】E

【答案解析】胃癌之瘀毒内阻证

证候：多见于进展期胃癌。胃脘刺痛拒按，呕血腥秽，或心下痞块坚硬，呕吐食

少，大便黑干；舌紫或有瘀斑，苔浊腻，脉沉涩。

治法：活血祛瘀，解毒养阴。

方药：失笑散合膈下逐瘀汤加减。

83. 【正确答案】A

【答案解析】乙、丙、丁型肝炎病毒可通过传染源的各种体液排出体外，通过皮肤或黏膜的破损口（显性或隐性）进入易感者的体内而传播。传播途径包括：（1）输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺器具等传播；（2）母婴传播；（3）性接触传播；（4）其他，如日常生活密切接触传播。

84. 【正确答案】E

【答案解析】甲、戊型肝炎主要经粪-口途径传播。粪便中排出的病毒通过污染手、水、食物等经口感染。散发病例以日常生活接触传播为主要方式，如水源或食物（如贝类海产品等）被污染可引起局部暴发或流行。甲、戊型肝炎在少见的情况下也可通过输血或血制品等传播。

85. 【正确答案】E

【答案解析】肝肾阴虚证治法：滋阴补肾，平肝潜阳。

86. 【正确答案】A

【答案解析】脾肾阳虚证治法：温肾健脾，化气行水。

87. 【正确答案】C

【答案解析】胆囊点：右侧腹直肌外缘与肋弓交界处。

88. 【正确答案】E

【答案解析】上输尿管点在脐水平线上，腹直肌外缘。

89. 【正确答案】E

【答案解析】病理情况下，肝浊音界向上移位见于右肺不张、气腹及鼓肠等；肝浊音界向下移位见于肺气肿、右侧张力性气胸等。肝浊音界扩大见于肝炎、肝脓肿、肝淤血、肝癌和多囊肝等；肝浊音界缩小见于急性肝坏死、晚期肝硬化和胃肠胀气等；肝浊音界消失，代之以鼓音，是急性胃肠穿孔的重要征象，亦可见于人工气腹。肝炎、肝脓肿时可出现肝区叩击痛。

90. 【正确答案】A

【答案解析】病理情况下，肝浊音界向上移位见于右肺不张、气腹及鼓肠等；肝浊音界向下移位见于肺气肿、右侧张力性气胸等。肝浊音界扩大见于肝炎、肝脓肿、肝淤血、肝癌和多囊肝等；肝浊音界缩小见于急性肝坏死、晚期肝硬化和胃肠胀气等；肝浊音界消失，代之以鼓音，是急性胃肠穿孔的重要征象，亦可见于人工气腹。肝炎、肝脓肿时可出现肝区叩击痛。

91. 【正确答案】A

【答案解析】奇脉指吸气时脉搏明显减弱或消失的现象，又称为吸停脉。

92. 【正确答案】D

【答案解析】将听诊器体件放在肱动脉等外周较大动脉的表面，可听到与心跳一致的“嗒——嗒——”音，称为枪击音。

93. 【正确答案】A

【答案解析】真热假寒证常有热深厥亦深的特点，故可称作热极肢厥证，古代亦有称阳盛格阴证者。

94. 【正确答案】B

【答案解析】真寒假热的实际是阳虚阴盛而阳气浮越，故又称虚阳浮越证，古代亦有称阴盛格阳证、戴阳证者。

95. 【正确答案】D

【答案解析】HBV-DNA 是 HBV 存在和复制最可靠的直接证据，反映病毒复制程度及传染性强弱，也常用来监测抗病毒药物的疗效。

96. 【正确答案】E

【答案解析】HBeAg 和抗-HBe：感染 HBV 后，HBeAg 可与 HBsAg 同时或稍后出现于血清中，其消失则稍早于 HBsAg。HBeAg 与 HBVDNA 有着良好的相关性，是病毒复制活跃、传染性强的标志。急性乙型肝炎患者若 HBeAg 持续阳性 10 周以上，可能转为慢性感染。抗-HBe 的出现预示着病毒复制减少或终止，传染性减弱。

97. 【正确答案】E

【答案解析】β受体阻滞药适用于 I、II 级高血压，对伴有心输出量偏高或血浆肾素活性增高者以及伴有冠心病、脑血管病变者更适宜。

98. 【正确答案】D

【答案解析】氢氯噻嗪适用于轻、中度水肿，是心性水肿的首选药。

99. 【正确答案】B

【答案解析】氯碘丙脲能促进抗利尿激素（ADH）分泌并增强其作用。

100. 【正确答案】A

【答案解析】二甲双胍的不良反应较磺酰脲类多见，如厌食、口苦、口腔金属味、胃肠刺激等胃肠道反应，低血糖症、维生素 B12 和叶酸缺乏、乳酸血症及酮血症，慢性心、肝、肾疾病患者及孕妇禁用。