

外科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 18 期

1. 女性，23 岁。阑尾切除术后第 4 天，体温 38℃，不伴腹痛，首先应做的检查是

- A. 检查伤口情况
- B. 行血常规检查
- C. 腹部 B 超检查
- D. 拍摄胸片
- E. 立即进行血培养

【正确答案】A

【答案解析】术后低热，无腹痛等症状，首先应检查切口情况，考虑切口感染。

【医学教育网原创】

2. 女，39 岁。反复腹泻 1 年，间有脓血便，粪培养阴性，多种抗生素治疗无效，为明确诊断，首选的检查是

- A. 腹部 CT
- B. 腹部平片
- C. 钡剂灌肠造影
- D. 结肠镜检查
- E. X 线胃肠钡餐检查

【正确答案】D

【答案解析】根据题中患者的病史、临床表现与实验室检查考虑溃疡性结肠炎的诊断可能性大。结肠镜检是本病诊断与鉴别诊断的最重要的手段之一。

【医学教育网原创】

3. 女性，30 岁。行甲状腺大部切除术后，出现饮水时呛咳，声音无改变，可能的原因是

- A. 喉返神经损伤
- B. 气管损伤
- C. 喉上神经损伤
- D. 交感神经损伤
- E. 喉头水肿

【正确答案】C

【答案解析】①喉上神经内支支配声门裂以上的喉黏膜的感觉，因此损伤后表现为喉部黏膜感觉丧失，进食或饮水时误咽、呛咳（C 正确）。②喉上神经外支支配环甲肌，损伤后表现为环甲肌瘫痪，引起声带松弛、音调降低。本例声音无改变，可见无喉上神经外支损伤。③喉返神经损伤主要表现为声音嘶哑、呼吸困难等。④气管损伤和交感神经损伤都不会出现呛咳。⑤喉头水肿表现为呼吸困难和窒息。

【医学教育网原创】

4. 女性，59 岁。右下腹半球形的突起半年，较小，咳嗽冲击感不明显。最可能的诊断是

- A. 股疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 腹股沟斜疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

【正确答案】A

【答案解析】股疝多见于中老年妇女，疝块较小，疝块呈半球形，咳嗽冲击感不明显（因为囊颈较为狭小），容易嵌顿、容易绞窄（因股环较小，周围多是韧带）。故选 A。

【医学教育网原创】

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕