

2021 年《中药学综合知识与技能》考前密卷（一）

一、最佳选择题

1. 《神农本草经》载药 365 种，将药物分为了上、中、下三品。其中
 - A. 上品 120 种，中品 120 种，下品 125 种
 - B. 上品 120 种，中品 125 种，下品 120 种
 - C. 上品 125 种，中品 120 种，下品 120 种
 - D. 上品 115 种，中品 130 种，下品 120 种
 - E. 上品 115 种，中品 120 种，下品 130 种
2. 某男，68 岁。近三天常感胃部胀满，噎腐恶食，且伴有吐不消化食物，舌苔厚腻，脉滑，就诊后，医生开具保和丸治疗。作为药师，发药时应告知患者服用的时间为
 - A. 空腹服
 - B. 饭后服
 - C. 饭前服
 - D. 清晨服
 - E. 睡前服
3. 药学咨询服务是执业药师参与全程化药物治疗的需要，对指导患者安全、有效、合理用药具有重大意义。执业药师向患者提供咨询服务时，做法错误的是
 - A. 向老年人解释时语速宜慢，还可以适当的多用些文字、图片形式以方便他们理解和记忆
 - B. 对女性患者来说，还需注意询问是否已经怀孕或有否准备怀孕的打算；是否正在哺乳
 - C. 解释时应使用描述性语言以便患者能正确理解，尽可能使用带数字的术语来帮助患者理解
 - D. 一定要尊重患者的意愿，保护患者的隐私
 - E. 对于患者所咨询的问题，能够给予当即解答的就当即解答，不能当即答复的，或者不十分清楚的问题，不要冒失地回答，要问清对方何时需要答复；待进一步查询相关资料以后尽快给予正确的答复
4. 任何疾病，尽管它的临床表现错综复杂，千变万化，但都可用阴或阳来加以概括辨析而运用于疾病的诊断辨证之中。下列疾病现象中属于阴的是
 - A. 面色鲜明

B. 咳声有力

C. 脉象滑数

D. 声低气怯

E. 脉象洪大

5. 某女，32 岁。症见五心烦热，颧红消瘦，盗汗，咽干口燥，舌红少津，脉细数无力。

医师处以麦冬、银柴胡、胡黄连、秦艽、鳖甲、地骨皮、青蒿、知母、甘草。其体现的治疗原则是

A. 阴病治阳

B. 阳病治阴

C. 阴中求阳

D. 阳中求阴

E. 阴平阳秘

6. 某男，35 岁。汗出较多，动则加剧，伴有少气懒言，困倦乏力，舌淡，脉细弱。基

于气的生理功能分析，该病证属于

A. 气的推动作用失常

B. 气的温煦作用失常

C. 气的防御作用失常

D. 气的固摄作用失常

E. 气的气化作用失常

7. 某女，22 岁，身体偏寒，喜静，少动，其体质类型应辨为

A. 偏阳质

B. 气虚质

C. 偏阴质

D. 痰湿质

E. 瘀血质

8. 中医诊断用以分辨病位与病势深浅的纲领是

A. 表里

B. 寒热

C. 虚实

D. 气血

E. 阴阳

9. 某男，33 岁。突然出现片状脱发，其临床意义是

A. 瘀血阻络

B. 血寒不通

C. 精血不足

D. 血虚受风

E. 肾虚精亏

10. 某男，33 岁。发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤，烦躁不宁，大便干燥，小便短赤，舌红苔黄而干燥，脉数。中医辨证是

A. 实热

B. 虚热

C. 虚实错杂

D. 实寒

E. 里寒表热

11. 患者，女，49 岁，不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。医生诊断为不寐证，其中医证候是

A. 气滞血瘀

B. 肝阳上亢

C. 心脾两虚

D. 痰气郁结

E. 肝脾不调

12. 血清淀粉酶（AMY）活性增高最常见于

A. 急性肠胃炎

B. 病毒性肝炎

C. 慢性胆囊炎

D. 急性胰腺炎

E. 病毒性心肌炎

13. 某男，35 岁。形体肥胖，嗜食肥甘，口中黏腻，来院进行血糖、血脂等相关检查。

检查结果：FBG 5.6 mmol/L、TC 5.16mmol/L，TG 2.45mmol/L，HDL-C 1.4mmol/L，LDL-C 2.27mmol/L。其中，指标异常的是

A. FBG

B. TG

C. TC

D. HDL-C

E. LDL-C

14. 某女，78 岁，近日除可见四肢厥逆，下列清谷，脉微欲绝的症状外，还可见身热反不恶寒（但欲盖衣被），面颊泛红等假热之象，针对其症状，应采用的治法是

A. 寒者热之

B. 热者寒之

C. 热因热用

D. 寒因寒用

E. 治热以寒

15. 某女，56 岁。恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咯痰无力，舌淡苔白，脉浮而无力。治法宜首选

A. 辛温解表

B. 辛凉解表

C. 祛湿解表

D. 益气解表

E. 滋阴解表

16. 某女，33 岁。咳嗽频剧，咯痰不爽，痰黏稠而黄，咳声嘶哑，喉燥咽痛，身热恶风，头痛肢楚，鼻流黄涕，口渴，苔薄黄，脉浮数。治法宜

A. 疏风清肺，润肺止咳

B. 疏风散寒，宣肺止咳

C. 疏风清热，宣肺止咳

D. 滋阴润肺，化痰止咳

E. 清热肃肺，豁痰止咳

17. 某女，60 岁，有冠心病史半年，昨日因劳作太累，胸部隐隐作痛，神疲乏力，气

短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩。治疗主方选

- A. 补阳还五汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 当归四逆散
- D. 甘麦大枣汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤

18. 某女，35 岁。胃痛胀满，噎腐恶食，矢气后痛减，医生辨为饮食伤胃证，治宜选用的方剂是

- A. 良附丸
- B. 保和丸
- C. 左金丸
- D. 四神丸
- E. 健脾丸

19. 某女，59 岁，大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐。舌苔白腻，脉弦紧。应选用的方剂是

- A. 六磨汤加减
- B. 麻子仁丸加减
- C. 温脾汤合半硫丸加减
- D. 润肠丸加减
- E. 大承气汤加减

20. 某男，77 岁。眩晕日久不愈，精神萎靡，两目干涩，视力减退，腰膝酸软，耳鸣齿摇，颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数。治宜选用的中成药是

- A. 归脾丸
- B. 松龄血脉康胶囊
- C. 参茸阿胶
- D. 左归丸
- E. 半夏天麻丸

21. 某男，58 岁。肌肤不仁，手足麻木，突然发生口眼歪斜，语言不利，口角流涎，舌强语蹇，半身不遂，舌苔薄白，脉浮数。治宜选用的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 补阳还五汤
- C. 复元活血汤
- D. 真方白丸子
- E. 龙胆泻肝汤

22. 某女，66 岁。遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，大便干结，舌红，苔黄腻，脉沉数。辨析其证候是

- A. 水湿浸渍证
- B. 脾阳虚衰证
- C. 肾阳衰微证
- D. 风水相搏证
- E. 湿热壅盛证

23. 某患者，男，37 岁，近日出现神疲乏力，少气懒言，声音低微，头晕，自汗，不思饮食，活动后症状加重。医师诊断为气虚，治疗可选用的方剂是

- A. 四君子汤
- B. 四物汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 附子理中汤
- E. 桂附地黄汤

24. 某男，53 岁。腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适。舌苔薄，脉弦。治疗宜选用的方剂为

- A. 逍遥丸合木香顺气散
- B. 柴胡疏肝散合失笑散
- C. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- D. 八珍汤合化积丸
- E. 补中益气汤

25. 某女，33 岁，患有毛囊炎，皮肤红肿疼痛，溃后有少量脓液，治宜选用的中成药是

- A. 连翘败毒丸

- B. 芩连片
- C. 如意金黄散
- D. 老鹳草软膏
- E. 知柏地黄丸

26. 某女，19 岁，左侧乳房出现肿块，月经前增大，乳房胀痛，乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑。治宜选用的中成药是

- A. 乳增宁胶囊
- B. 乳核散结片
- C. 活血消毒丸
- D. 牛黄化毒片
- E. 活血消炎丸

27. 某男，42 岁。患有瘾疹，风团色白，遇寒加重，得暖则减；伴恶寒，口不渴。舌质淡红，苔薄白，脉浮紧。治宜选用的方剂是

- A. 枇杷清肺饮
- B. 茵陈蒿汤
- C. 二陈汤合桃红四物汤
- D. 桂枝麻黄各半汤
- E. 消风散

28. 某男，38 岁，患有不育症多年。阳事不兴，死精较多。伴有小腹急满，小便短赤。舌苔薄黄，脉弦滑等症。治疗宜选用的方剂是

- A. 大补元煎
- B. 五子衍宗丸
- C. 柴胡疏肝散
- D. 程氏萆薢分清饮
- E. 顺气活血汤

29. 患者，女，23 岁，未婚。近 2 年来每次月经提前 1~2 周，量多少不定，色紫红有块，质稠，头晕目眩，胸胁胀满，少腹胀痛，精神抑郁，心烦易怒。治疗可选用的方剂是

- A. 固阴煎
- B. 玉女煎

C. 乌鸡白凤丸

D. 丹栀逍遥散

E. 女金丸

30. 某女，50 岁。绝经前后，月经紊乱，心烦易怒，哭笑无常，夜卧多梦善惊，口干渴饮，尿黄便燥，舌质红，苔薄黄，脉弦细而数，宜选用的方剂是

A. 百合地黄汤

B. 左归丸

C. 右归丸

D. 金匱肾气丸

E. 逍遥散

31. 某女，58 岁。咽部疼痛，咳嗽时疼痛加剧，咽部红肿，颌下有髻核；伴见发热恶风，头痛，咳嗽痰黄。舌质红，苔黄，脉浮数。治宜选方

A. 养阴清肺汤

B. 疏风清热汤

C. 清咽利膈汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 瓜蒌薤白半夏汤

32. 具有养心安神功效的藏药方剂是

A. 洁白丸

B. 八味沉香散

C. 志嘎汗散

D. 仁青常觉

E. 七十味珍珠丸

33. 蒙医药基础知识中，“三根”指的是

A. 隆、赤巴、培根

B. 赫依、希日、巴达干

C. 稠、稀、汗

D. 大便、小便、汗液

E. 精气、血、津液

34. 药师调剂处方时必须做到“四查十对”，以下不属于四查内容的是

- A. 查处方
- B. 查药品
- C. 查配伍禁忌
- D. 查用药合理性
- E. 查临床诊断

35. 大黄（庶虫）虫丸活血破瘀，通经消癥，治疗瘀血内停所致的癥瘕、闭经，方中的大黄应选用

- A. 生大黄
- B. 酒大黄
- C. 熟大黄
- D. 大黄炭
- E. 醋大黄

36. 同一植物来源但用药部位不同，且功效不同，不能排列在一起的是

- A. 藜芦与漏芦
- B. 附子与白附子
- C. 天葵子与冬葵子
- D. 韭菜子与葱子
- E. 麻黄与麻黄根

37. 某男，38 岁。因患有癫痫服用西药抗癫痫药治疗，出现了肝损害、嗜睡等副作用，医师建议加用中药复方，那么能够减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用的方剂是

- A. 复方丹参滴丸
- B. 十全大补汤
- C. 柴胡桂枝汤
- D. 芍药甘草汤
- E. 竹叶石膏汤

38. 某男，66 岁，因患有高血压服用卡托普利治疗，为了提高此药对老年高血压的治疗效果，医生建议加用中药，可选用的中药是

- A. 补中益气汤

B. 逍遥散

C. 钩藤散

D. 柴朴汤

E. 半夏泻心汤

39. 执业药师在指导低血压患者使用间羟胺（阿拉明）或多巴胺类药物时，为提高升压作用，减轻对升压药的依赖，可嘱患者同用的中成药是

A. 生脉注射液

B. 丹参注射液

C. 黄芪注射液

D. 川芎嗪注射液

E. 参附注射液

40. 香加皮不良反应的表现是

A. 心律失常

B. 水肿

C. 血尿

D. 皮肤糜烂

E. 皮肤黄染

二、配伍选择题

[41~42]

A. 心主血脉

B. 肺朝百脉

C. 脾主统血

D. 肝主藏血

E. 肝主疏泄

41. 具有促进血液运行，调畅情志活动等生理功能的是

42. 具有推动血液运行，主宰精神活动等生理功能的是

[43~44]

A. 实中夹虚

B. 虚中夹实

C. 真虚假实

D. 真实假虚

E. 因虚致实

43. 某男，40 岁。腹满痛拒按，潮热谵语，但下利清水。辨证为热结旁流，病机为“大实有羸状”，属于

44. 某男，62 岁。腹胀腹痛，时胀时止，食少便溏。自行服用气滞胃痛颗粒，症状不减。辨证为脾失健运，病机为“至虚有盛候”属于

[45~46]

A. 镜面舌

B. 齿痕舌

C. 裂纹舌

D. 芒刺舌

E. 胖大舌

45. 心火亢盛患者的舌象多见

46. 脾虚湿盛患者的舌象多见

[47~49]

A. 心阳虚证

B. 肝肾阴虚证

C. 心血虚证

D. 心气虚证

E. 心阴虚证

47. 某男，73 岁。心悸，气短，自汗，形寒肢冷，心胸憋闷，面色苍白，舌淡。中医辨证为

48. 某女，55 岁。心悸，心烦，易惊，失眠，健忘，眩晕，面色不华，唇舌色淡，脉细弱，中医辨证为

49. 某女，68 岁。头晕目眩，耳鸣，胁痛，腰膝酸软，咽干，颧红，盗汗，五心烦热，舌红无苔，脉细数。中医辨证为

[50~52]

A. 桑菊饮

B. 沙参麦冬汤

C. 桑杏汤

D. 清金化痰汤

E. 银翘散

50. 某女，25 岁，干咳无痰，不易咳出，鼻燥咽干，舌红少津，脉细数。辨证为燥邪伤肺，治宜选用的方剂是

51. 某女，40 岁。干咳无痰，痰中带血，午后咳甚，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，辨证为肺肾阴虚。治宜选用的方剂是

52. 某男，31 岁。咳嗽气粗，咯痰黏稠，咽痛，口微渴，舌边尖红苔薄黄，脉浮数。辨证为风热犯肺，治宜选用的方剂是

[53~55]

A. 小青龙合剂

B. 养阴清肺膏

C. 复方鲜竹沥液

D. 补金片

E. 百合固金丸

53. 某男，78 岁。喘促日久，呼多吸少，气不得续，动则喘甚，形瘦神疲，汗出肢冷；舌淡，苔薄脉沉。宜选用的中成药是

54. 某男，43 岁。有慢性支气管炎病史，7 日前因患感冒，现症状加重，咳嗽气粗，胸部胀痛，痰黏稠色黄，胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，咽干，面红，尿赤，便秘；舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的中成药是

55. 某女，35 岁。受凉后出现喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞，无汗，恶寒，发热；舌苔薄白而滑，脉浮紧。宜选用的中成药是

[56~58]

A. 腹泻肠鸣，粪便臭如败卵，夹有不消化食物

B. 黎明之前，肠鸣腹痛，泻后则安，腰膝酸软

C. 泄泻腹痛，粪色黄褐，肛门灼热，烦热口渴

D. 大便溏泻，水谷不化，面色萎黄，食少倦怠

E. 紧张之时，腹痛欲便，便后痛减，时时叹息

56. 脾胃虚弱泄泻的临床特点是

57. 肾阳虚衰泄泻的临床特点是

58. 食滞胃肠泄泻的临床特点是

[59~62]

A. 参苓白术散

B. 六味地黄丸

C. 消渴平片

D. 附子理中丸

E. 金匱肾气丸

59. 某女，35 岁。烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红，苔薄黄，脉滑数，治疗宜选用的中成药是

60. 某女，68 岁。口渴引饮，能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力。舌淡，苔薄白而干，脉细弱无力，治疗宜选用的中成药是

61. 某男，44 岁。尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力肤燥，舌红少苔，脉细数，治疗宜选用的中成药是

62. 某女，42 岁。小便频数，咽干舌燥，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡，苔白乏津，脉沉细无力，治疗宜选用的中成药是

[63~65]

A. 补中益气丸

B. 知柏地黄丸

C. 丹栀逍遥丸

D. 血府逐瘀口服液

E. 连翘败毒丸

63. 某女，49 岁。夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥。舌质红，有裂纹，无苔，脉细数。治宜选用的中成药是

64. 某女，33 岁。低热 3 天有余，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少。舌红，苔黄，脉弦数。治宜选用的中成药是

65. 某女，66 岁。夜晚发热，口燥咽干，但不多饮，躯干有固定痛处，面色晦暗。舌质青紫，有瘀点，脉涩。治宜选用的中成药是

[66~67]

- A. 乌鸡白凤丸
- B. 丹栀逍遥丸
- C. 益母丸
- D. 妇科调经片
- E. 艾附暖宫丸

66. 某女，35 岁。因月经不调就诊，诊断为月经先期，辨证属肝郁血热证，宜选用的中成药是

67. 某女，42 岁。因月经不调就诊，诊断为月经后期，辨证属气滞证，宜选用的中成药是

[68~69]

- A. 固本止崩汤加减
- B. 逍遥散加减
- C. 调肝汤加减
- D. 内补丸加减
- E. 归肾丸加减

68. 某女，40 岁。月经非时而下，量多如崩，色淡质稀，神疲体倦，面色萎黄；舌质淡，舌体胖，苔薄白，脉弱。应选用的方剂是

69. 某女，21 岁。月经先期，量少，色淡质稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，小便频数；舌质暗淡，苔薄白，脉沉细。应选用的方剂是

[70~71]

- A. 生黄连
- B. 酒黄连
- C. 萸黄连
- D. 黄连炭
- E. 姜黄连

70. 泻心汤泻火解毒，方中选用黄连为

71. 香连丸清热化湿、行气止痛，方中选用黄连为

[72~73]

- A. 双黄连口服液
- B. 八珍颗粒
- C. 小金丸
- D. 人参归脾丸
- E. 枣仁安神胶囊

妊娠期妇女使用中成药时要慎重选择，以免损伤胎儿及母体。

72. 根据《中国药典》，孕妇应禁用的中成药是

73. 根据《中国药典》，孕妇应慎用的中成药是

[74~75]

A. 0.03~0.06g

B. 0.1~0.5g

C. 2~5g

D. 5~10g

E. 10~15g

74. 《中国药典》规定，苦杏仁的用量是

75. 《中国药典》规定，斑蝥的用量是

[76~78]

A. 忌用开窍药

B. 忌用涩肠止泻药

C. 忌用苦寒药

D. 忌用发汗药

E. 忌用温热药

76. 某女，35岁。症见自汗，恶风，气短乏力，舌淡，脉虚弱，此患者的证候禁忌是

77. 某男，20岁。平日喜食热饮，近日胃痛，大便稀溏，四肢不温，此患者的证候禁忌是

78. 某男，25岁。平日喜食煎炒烹炸食物，近日牙龈红肿，咽喉肿痛，此患者的证候禁忌是

[79~80]

A. 痹祺胶囊

B. 阳和解凝膏

C. 九一散

D. 九分散

E. 麝香通心滴丸

79. 含有马钱子粉，破伤出血者不可外敷的中成药是

80. 含有蟾酥，运动员慎用的中成药是

[81~82]

A. 藏红花

B. 土鳖虫

C. 吴茱萸

D. 人参

E. 蛤蚧

81. 按照对抗贮存法，宜与大蒜同贮的是

82. 按照对抗贮存法，宜与花椒同贮的是

[83~84]

A. 通风干燥处

B. 避光凉爽处

C. 凉暗处

D. 密闭容器中

E. 阴暗处

83. 含糖分多的饮片，应贮存于

84. 炒至后的种子类饮片，应贮存于

[85~86]

A. 川贝枇杷露与天麻丸

B. 附子理中丸与参茸卫生丸

C. 七厘散与血府逐瘀丸

D. 当归补血汤与牵正散

E. 牛黄解毒片与附子理中丸

85. 因配伍禁忌而不宜合用的药组是

86. 因证候禁忌而不宜合用的药组是

[87~90]

- A. 呼吸麻痹，昏迷惊厥，瞳孔散大，对光反应消失
- B. 呼吸浅表不规则，面色苍白，发绀，瞳孔极度缩小呈针尖样
- C. 出现各种出血症状，严重脱水，低蛋白血症
- D. 乏力，纳差，尿黄，头晕，厌恶油腻，严重者表现为急性肝炎
- E. 四肢麻木，行走不稳，烦躁不安，精神错乱，手舞足蹈，昏迷，幻觉

87. 蓖麻子在使用时容易出现的不良反应表现是

88. 黄药子在使用时容易出现的不良反应表现是

89. 苦杏仁在使用时容易出现的不良反应表现是

90. 罂粟壳在使用时容易出现的不良反应表现是

三、综合分析选择题

[91~93]

某女，55岁。近几日总是心悸不安，胸闷气短，稍微劳作则症状加剧，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白。脉虚弱。

91. 中医应辨证为

- A. 心脾两虚证
- B. 心阳不振证
- C. 瘀阻心脉证
- D. 阴虚火旺证
- E. 心血不足证

92. 治疗应采用的治法是

- A. 镇惊定志，养心安神
- B. 补血养心，益气安神
- C. 滋阴清火，养心安神
- D. 温补心阳，安神定悸
- E. 振奋心阳，宁心安神

93. 中医治疗时首选桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤。以下关于方剂中饮片选择的建议，表述错误的是

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤中桂枝也可改为肉桂，肉桂补火助阳，温通经脉
- B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤中甘草为蜜炙甘草，善于补中益气，调和诸药
- C. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤中龙骨、牡蛎为煅制品，增强其收敛固涩作用
- D. 参附汤中选用红参，补气的同时尚有刚健温燥之性，最善振奋阳气
- E. 参附汤中选用淡附片，毒性极微，应用安全，药力缓和，常用于温肾壮阳

[94~96]

某男，35 岁。眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，遗精，滑泄，耳鸣齿摇，颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数。

94. 中医应辨证为

- A. 肝肾亏虚证
- B. 痰湿中阻证
- C. 肾精不足证
- D. 肝阳上亢证
- E. 气血亏虚证

95. 治宜选用的治法是

- A. 平肝潜阳，滋养肝肾
- B. 补益气血，调养心脾
- C. 滋养肝肾，益精填髓
- D. 化痰祛湿，健脾和胃
- E. 疏肝理气，清热利湿

96. 治疗应以下列何方为主

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 六味地黄丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 杞菊地黄丸

[97~99]

患者，男，36 岁，建筑工人。双膝关节反复疼痛 6 年。今年 3 月天气突然转冷，关节疼痛加剧，痛处固定，局部较冷，热敷后疼痛稍减，关节屈伸不利。舌质淡红而润，苔白而

薄腻，脉弦紧。

97. 其诊断是

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 寒痹

98. 其治法是

- A. 散寒通络，祛风除湿
- B. 培补肝肾，舒筋止痛
- C. 清热通络，祛风除湿
- D. 补益肝肾，滋阴清热
- E. 化痰行瘀，蠲痹通络

99. 治疗应首选的方剂是

- A. 薏苡仁汤
- B. 防风汤
- C. 乌头汤
- D. 白虎桂枝汤
- E. 独活寄生汤

[100~102]

某女，1岁2个月。母亲诉患儿近期不思乳食，嗳腐酸馊，呕吐食物，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热。诊察见患儿舌质红，苔黄厚腻，脉弦滑，指纹紫滞。

100. 中医应辨证为

- A. 乳食内积证积滞
- B. 脾虚夹积证积滞
- C. 脾失健运证厌食
- D. 脾胃气虚证厌食
- E. 脾胃阴虚证厌食

101. 中医治疗应选用的治法是

- A. 健脾助运，消食化滞
- B. 调和脾胃，运脾开胃
- C. 健脾益气，佐以助运
- D. 消乳化食，和中导滞
- E. 滋脾养胃，佐以助运

102. 治宜选用的方剂是

- A. 健脾丸加减
- B. 消乳丸加减
- C. 不换金正气散加减
- D. 异功散加减
- E. 养胃增液汤加减

[103~104]

某女，35 岁。因银屑病口服复方青黛丸，每日 3 次，每次 6g。服药 23 天后，出现乏力、恶心、腹胀、纳差。检查结果显示患者肝功能异常，临床诊断为药物性肝损伤。排除了其他因素后，停用复方青黛丸，肝功能逐步恢复正常。查阅患者病历，患者 2 年前服用该药 20 天，也曾出现相同症状。

103. 该患者肝功能异常的不良反应与复方青黛丸之间的因果关系应评价为

- A. 很可能
- B. 可能
- C. 无法评价
- D. 肯定
- E. 待评价

104. 复方青黛丸常见的不良反应不包括

- A. 头晕
- B. 腹痛腹泻
- C. 肾功能损伤
- D. 胃肠道出血
- E. 肝功能异常

[105~107]

患者，男，35 岁。阳事不兴，伴小腹急满，小便短赤，舌苔薄黄，脉弦滑。来院检查见死精较多。请根据病例回答以下问题。

105. 宜选用的方剂是 ()

- A. 归脾汤
- B. 右归丸
- C. 程氏萆薢分清饮
- D. 柴胡疏肝散
- E. 大补元煎合五子衍宗丸

106. 宜选用的中成药是 ()

- A. 麒麟丸
- B. 柴胡舒肝丸
- C. 还精煎口服液
- D. 补肾康乐胶囊
- E. 黄精赞育胶囊

107. 上述中成药的用药指导正确的是 ()

- A. 口服，2 个月一疗程
- B. 脾气久虚者禁用
- C. 腹胀便溏者禁用
- D. 每次 10 粒，每日三次
- E. 可联合服用前列通片、八正合剂等来辅助治疗此证

[108~110]

某女，33 岁。甲状腺结节就诊，医师开具处方如下：醋柴胡 3g，郁金 10g，香附 10g，黄药子 10g，海藻 15g，昆布 15g，浙贝母 10g，白芥子 10g，白芍 10g，陈皮 6g。

108. 该患者服用 7 剂后，出现乏力、纳差、尿黄、头晕、厌油腻等症状，相关检查显示血 ALT、AST 显著升高，处方中最可能引起该不良反应的中药是

- A. 柴胡
- B. 郁金
- C. 黄药子

- D. 白芥子
- E. 香附

109. 该中药中引起肝损伤的主要化学物质属于

- A. 毒蛋白类
- B. 生物碱类
- C. 鞣质类
- D. 多肽类
- E. 萜类

110. 因上述中药具有一定的肝脏毒性，故不宜与具有肝毒性的西药联用，以免引发药源性肝病。不宜与上述中药联用的西药不包括

- A. 红霉素
- B. 四环素
- C. 利福平
- D. 呋喃唑酮
- E. 氯丙嗪

四、多项选择题

111. 根据未病先防的原则，扶助正气，提高抗病能力的方法有

- A. 讲究卫生
- B. 注意起居
- C. 锻炼身体
- D. 人工免疫
- E. 精神调养

112. 某女，53岁。肌肤不仁，手足麻木，突然发生口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌苔薄白，脉浮数。治宜选用的中成药有

- A. 大活络丸
- B. 再造丸
- C. 小活络丸
- D. 豨蛭络达胶囊
- E. 松岭血脉康胶囊

113. 影响中药质量变异的环境因素有

- A. 湿度
- B. 温度
- C. 日光
- D. 空气
- E. 害虫

114. 不合理用药的后果有

- A. 浪费医疗资源
- B. 延误疾病治疗
- C. 造成医疗事故
- D. 造成医疗纠纷
- E. 引发药源性疾病

115. 盐酸麻黄碱有舒张支气管、加强心肌收缩力、增强心输出量的作用，并有较强的兴奋中枢神经作用，能收缩局部血管。对于前列腺肥大者可引起排尿困难，大剂量或长期应用可引起震颤、焦虑、失眠、头痛、心悸、心动过速等不良反应。故甲状腺功能亢进症、高血压病、动脉硬化、心绞痛患者应禁用含盐酸麻黄碱的中成药。那么含有盐酸麻黄碱的中成药有

- A. 止咳宝片
- B. 痰咳清片
- C. 咳特灵片
- D. 镇咳宁糖浆
- E. 鼻炎通喷雾剂

116. 肝功能不全患者应避免使用

- A. 芦荟
- B. 苍耳子
- C. 相思豆
- D. 益母草
- E. 苦参

117. 肾功能不全时，药物代谢和排泄会受到影响。对于同一药物、相同剂量，肾功能正

常者使用可能是安全的，但对肾功能不全者则可能引起蓄积而加重肾脏损害。以下关于肾功能不全者用药基本原则和注意事项的叙述，说法正确的是

- A. 明确疾病诊断和治疗目标
- B. 忌用有肾毒性的药物
- C. 注意药物相互作用，避免产生新的损害
- D. 坚持少而精的用药原则
- E. 定期检查，及时调整治疗方案

118. 与药物不良反应相关的临床使用因素有

- A. 剂量过大
- B. 疗程过长
- C. 辨证不准
- D. 配伍失度
- E. 炮制不当

119. 某男，78 岁。患多种慢性病，因腰腿疼痛、头晕失眠等不适症状就诊。医师开具中成药处方如下：

xx 医院处方笺

就诊卡号：xxxx 就诊科室：中医科门诊

姓名：XX 性别：男 年龄：78 费别：医保

临床诊断：	风湿骨痛胶囊	0.3g×32	3 盒	3 粒	口服	一日两次
痹症	松龄血脉康胶囊	0.5g×24	2 盒	3 粒	口服	一日三次
眩晕	养血安神片	0.25g×100	2 盒	5 片	口服	一日三次
不寐	乌灵胶囊	0.33g×36	5 盒	3 粒	口服	一日三次
	金匱肾气丸	0.2g×360	2 盒	20 粒	口服	一日两次
医师签名（签章）：XXX						
××××年××月××日						

金额：××× 审核/调配签名（签章）：×× 核对/发药签名（签章）：××

执业药师审方时，发现该处方中多种中成药均含有乌头类药，可能加大患者发生不良反应的风险。该处方中含有乌头类药的中成药有

- A. 乌灵胶囊
- B. 金匮肾气丸
- C. 左归丸
- D. 风湿骨痛胶囊
- E. 右归丸

120. 以下有关中药注射剂合理应用的基本原则，描述正确的有

- A. 能口服给药的，不选用注射给药；能肌内注射给药的，不选用静脉注射或滴注给药
- B. 临床使用应辨证用药，严格按照药品说明书规定的功能主治使用，禁止超功能主治用药
- C. 中药注射剂应单独使用，禁忌与其他药品混合配伍使用
- D. 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者应慎重使用，加强监测
- E. 用药过程中，应密切观察用药反应，特别是开始 30 分钟。发现异常立即停药，采用积极救治措施，救治患者