

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022年第53期

问题索引:

1. 【问题】食管癌侵犯主动脉和支气管临床表现是什么?
2. 【问题】张力性气胸出现极度呼吸困难发绀的主要原因?
3. 【问题】高渗性脱水, 低渗性脱水, 等渗性脱水的区别?
4. 【问题】阑尾炎后突然腹痛加重, 范围加大, 考虑什么?

具体解答:

1. 【问题】食管癌侵犯主动脉和支气管临床表现是什么?

【解答】随着肿瘤发展, 食管癌可侵犯邻近器官或向远处转移, 出现相应的晚期症状。

①癌肿侵犯喉返神经, 可发生声音嘶哑; ②侵入主动脉, 溃烂破裂, 可引起大量呕血; ③侵入气管, 可形成食管气管瘘, 可出现进食呛咳和肺部感染; ④持续胸痛或背痛为晚期症状, 表示癌肿已侵犯食管外组织; [医学/教育网]⑤晚期病人可有不同程度脱水, 消瘦、贫血和低蛋白血症等恶病质, 以及出现肝大触及肿块, 胸水、腹水等。

2. 【问题】张力性气胸出现极度呼吸困难发绀的主要原因?

【解答】由气管、支气管、肺损伤裂口或伤口与胸膜腔相通, 且形成活瓣, 患侧胸膜腔内压力进行性增高, 对肺的压迫和对纵隔的推移越来越大, 造成严重呼吸循环功能障碍。[医学/教育网]

3. 【问题】高渗性脱水, 低渗性脱水, 等渗性脱水的区别?

【解答】

	低渗性	等渗性	高渗性
血钠 (mmol/L)	<130	130~150	>150
口渴	不明显	明显	极明显
皮肤弹性	极差[医学/教育网]	稍差	尚可
血压	明显下降	下降	正常/稍低

神志	嗜睡/昏迷	萎靡	烦躁/惊厥
----	-------	----	-------

4. 【问题】肺结核化疗方案的疗程一般是？

【解答】阑尾炎患者保守治疗后出现腹痛缓解后突然加重，范围加大，考虑为阑尾穿孔引起的腹膜炎体征。阑尾化脓、坏疽时有腹肌紧张、反跳痛，如腹膜刺激征范围扩大，说明阑尾发生穿孔。阑尾周围脓肿形成后，在右下腹触及边界不清和较为固定的压痛性包块。

