

口腔执业医师: 《答疑周刊》2022 年第 37 期

问题索引:

1. 急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径是那一条?
2. 急性根尖周炎浆液期有何临床特点?
3. 急性疱疹性口炎与疱疹样口疮有何区别?
4. 念珠菌口炎的诊断方法有哪些?

具体解答:

1. 急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径是那一条?

急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径

- A. 根尖孔→根管→髓腔
- B. 根尖周→骨膜下→黏膜下
- C. 根尖周→骨膜下→皮肤下
- D. 根尖周→牙周间隙→龈沟
- E. 根尖周→骨髓腔→上颌窦

【正确答案】B

【答案解析】根尖周→骨膜下→黏膜下, 此排脓方式是急性根尖周炎最常见的典型自然发展过程。这种排脓途径较复杂, 并常伴发颌面部蜂窝组织炎。[医学教育网原创]

2. 急性根尖周炎浆液期有何临床特点?

急性根尖周炎浆液期的临床症状如下, 除外

- A. 持续自发痛
- B. 患牙浮出感
- C. 温度测有反应
- D. 患牙能明确定位
- E. 咬紧牙时痛加重

【正确答案】C

【答案解析】①初期患牙根尖部不适、木胀浮出感, 咬合时与对(牙合)牙有早接触感, 有时用力咬紧患牙反而稍感舒服。尚无自发痛或仅轻微钝痛。②随

着病情发展,患牙浮出和伸长的感觉逐渐加重,出现自发性、持续性钝痛,咬合时不仅不能缓解症状,反而引起较剧烈的疼痛,影响进食。③疼痛范围局限于患牙根部,不引起放散,患者能够指明患牙。[医学教育网原创]

3. 急性疱疹性口炎与疱疹样口疮有何区别?

下面哪项不是急性疱疹性口炎与疱疹样口疮的区别

- A. 好发年龄不同
- B. 性别差异
- C. 前者为急性发作、全身反应较重;后者为反复发作、全身反应较轻
- D. 前者病损表现为成簇小水疱;后者病损表现为散在小溃疡
- E. 前者病损可伴皮肤损害;后者病损无皮肤损害

【正确答案】B

【答案解析】疱疹样口疮即为疱疹样复发性阿弗他溃疡,为散在分布的单个小溃疡,反复发作,没有发疱史;溃疡数量较多,主要分布于口腔内角化程度较差的黏膜处。不造成牙龈红肿,儿童少见,无皮肤损害。但二者并无明显的性别差异。[医学教育网原创]

4. 念珠菌口炎的诊断方法有哪些?

对于念珠菌性口炎中慢性肥厚型的高龄患者,为了明确诊断有无异常增生,首选的诊断方法是

- A. 唾液培养
- B. 唾液及血清念珠菌抗体测定
- C. 活体组织检查
- D. 直接涂片镜检
- E. 血 CEA 测定

【正确答案】C

【答案解析】活检法:对于慢性或肥厚性损害可进行活检,镜下可见增生的口腔黏膜上皮细胞间有念珠菌丝侵入组织,引起上皮表层水肿,角化层内有中性粒细胞浸润,常形成微小脓肿。[医学教育网原创]