

儿科主治医师 考点回顾

考点回顾整理，仅供参考！

医学教育网 著

北京正保医教科技有限公司 版权所有

考点回顾 (2022 年)

40%的室缺闭合年龄

解析：40%的室缺在3——4岁内自然闭合。

共用选项：坐稳年龄，抬头稳定年龄，握物年龄

解析：儿童坐稳年龄是8个月；抬头稳定是4个月，握物年龄是4个月（教材无明确说握

物，但为4个月能握持玩具）。

中度，高度失水的补液

解析：中度补液120——150ml/kg，高度（重度）补液是150——180ml/kg。

新生儿复苏，气管给药，复苏后低血压心率低给药，还有室颤动给药

解析：复苏气管给药一般给肾上腺素；复苏后低血压、心率一般是给异丙肾上限速；室颤用

药可以是利多卡因。

麻疹的首发

解析：麻疹首发出疹部位为耳后发际。

发热半天下午出疹，应该是风疹，然后幼儿急疹，三天后退疹；风疹，麻疹，幼儿急疹，猩

红热

解析：发热半天出疹，3 天后退疹考虑风疹，风疹 1 天内出齐，出疹平均 3 日。

幼儿急疹是热退疹出。麻疹是热盛疹出，猩红热特点是口周苍白圈、巴氏线。

抽动症还是多动症用药

解析：多动症首选盐酸哌甲酯。

动脉导管未闭年龄 3 个月

解析：动脉导管未必 80%在生后 3 个月解剖性关闭。

有一个案例发热腹泻咳嗽 7 天，支原体 IgM 阳性，最后有个杨梅舌，肛周脱皮，四肢水肿

解析：本例考虑支原体肺炎、川崎病。支原体 IgM 阳性提示是支原体感染，杨梅舌，肛周

脱皮，四肢水肿为川崎病的表现。

新生儿败血症是直接胆红素高还是间接胆红素高

解析：新生儿败血症主要引起间接胆红素升高。

