

妇产科主治医师

——基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题答案及解析》

一、A1 型题

1.

【正确答案】 C

【答案解析】 孕激素及其受体可促进肌瘤增殖、调节肌瘤有丝分裂活动、增加体细胞突变，刺激肌瘤生长，对肌瘤形成有重要作用。

2.

【正确答案】 E

【答案解析】 红细胞沉降率一般在产后 3~4 周恢复正常。

3.

【正确答案】 B

【答案解析】 关于子宫内膜异位症发病机制主要是种植学说。

4.

【正确答案】 B



【答案解析】 因此预防性化疗仅适用于有高危因素和随访困难的完全性葡萄胎患者，但也非常规。当出现下列高危因素之一时应视为高危葡萄胎：①hCG > 100000U/L；②子宫明显大于相应孕周；③卵巢黄素化囊肿直径 > 6cm。另外，也有认为年龄 > 40 岁和重复葡萄胎是高危因素。部分性葡萄胎很少转变为恶性，不是预防性化疗的指征。

5.

【正确答案】 D

【答案解析】 前置胎盘在孕足月或胎儿可存活情况下尽早终止妊娠，期待疗法适用于孕 35 周之前，胎儿发育不完全，胎儿体重小等。

6.

【正确答案】 C

【答案解析】 孕期使用胰岛素应该个体化，一般来讲，随着孕周增加，胰岛素抵抗至 32 ~ 33 周达到高峰，此时的胰岛素用量也达到最高峰。

7.

【正确答案】 E

【答案解析】 臀位助产有胎心异常需检查有无脐带脱垂，若有脐带脱垂，立即行剖宫产挽



救胎儿；堵臀为等待宫口完全开全。臀位分娩时应注意：脐部娩出后一般应于 8 分钟内结束分娩，以免因脐带受压而致死产

8.

【正确答案】 C

【答案解析】 分娩启动是炎症因子、机械性刺激等多因素综合作用的结果。C 的描述不全面。

9.

【正确答案】 E

【答案解析】 宫高及腹围值因个体差异是比较大的。所以不能推算孕周。

10.

【正确答案】 E

【答案解析】 疼痛程度与病灶大小不成比例。

二、A2 型题

1.

【正确答案】 B

【答案解析】 卵巢巨大囊实性包块，边界清，无腹水，无粘连，包膜完整，考虑囊腺瘤，

B超提示多房，囊实性，考虑为卵巢黏液性囊腺瘤可能性大。

2.

【正确答案】 D

【答案解析】 绝经后妇女发现右附件区实性包块，伴有阴道不规则流血，应检测血清雌激素水平。

3.

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠期及产褥期肌瘤易发生红色变，患者可有剧烈腹痛、发热、白细胞升高，肌瘤增大、压痛。

4.

【正确答案】 C

【答案解析】 子宫腺肌病表现为进行性加重的痛经，子宫球形增大。

5.

【正确答案】 B

【答案解析】 左炔诺酮 IUD 可导致闭经，若排除妊娠，可继续随访。

6.

【正确答案】 D

【答案解析】 子宫腺肌病患者避孕建议使用含孕激素 IUD，避孕时同时可治疗腺肌病。

7.

【正确答案】 B

【答案解析】 钳刮术中突然出现烦躁不安、咳嗽、胸闷、呼吸困难、发绀、心率加快、血压下降是羊水栓塞的表现。

8.

【正确答案】 E

【答案解析】 产妇在潜伏期，宫缩规律，骨盆测量正常，胎心监护正常，暂不需要特殊处理，严密观察产程进展即可。

9.

【正确答案】 B

【答案解析】 指妊娠产物已部分排出体外，尚有部分残留于宫腔或宫颈内，属于不全流产。

10.

【正确答案】 D

【答案解析】 侵袭性葡萄胎可发生阴道转移，表现为阴道前壁及穹窿呈紫蓝色结节，破溃时引起不规则阴道流血，甚至大出血。

11.

【正确答案】 C

【答案解析】 子宫收缩具有正常的节律性、对称性和极性，但收缩力弱，持续时间短，间歇期长且不规律，宫缩 < 2 次/10 分钟。考虑是低张性子宫收缩乏力。

12.

【正确答案】 C

【答案解析】 该患者 54 岁，绝经后阴道出血 8 个月，子宫增大稍软，最有诊断价值的辅助检查方法应为分段刮宫活组织检查。故选 C。

13.

【正确答案】 C

【答案解析】 排卵型功血的原因有很多种，黄体功能不足时，表现为月经周期缩短，月经频发。妇科检查无异常，基础体温双向型，但排卵后体温上升缓慢，上升幅度偏低，高温期小于 11 日，可诊断为黄体功能不足。而无排卵型功血、早期妊娠时基础体温曲线呈单相型，子宫内膜不规则脱落时经期延长，出血量增多。故选 C。

14.

【正确答案】 E

【答案解析】 根据患者育龄期女性，继发性痛经 3 年，查体：子宫后倾屈，偏大，质硬，考虑诊断子宫腺肌病。可有不孕、性交疼痛、经量过多、经期延长表现，不是月经稀发。故选 E。

15.

【正确答案】 D

【答案解析】 子宫腺肌病多发生于 40 岁以上的妇女，临床表现为经量增加、经期延长、进行性痛经，查体可见子宫均匀增大，质硬而有压痛；患者的临床表现符合子宫腺肌病，对

于子宫腺肌病的治疗，症状严重、年龄偏大、无生育要求或药物治疗无效者可采用全子宫切除，患者为经产妇，症状重，需强止痛药，故可手术治疗。故选 D。

16.

【正确答案】 B

【答案解析】 人工破膜指征：宫口扩张 3cm 或 3cm 以上、无头盆不称、胎头已衔接者，可行人工破膜。

17.

【正确答案】 D

【答案解析】 根据妇科检查以及产妇表现考虑是骨盆出口狭窄。

18.

【正确答案】 E

【答案解析】 根据患者表现考虑是阴道壁血肿，应进行清除阴道壁血肿后修补缝合。

19.

【正确答案】 C

【答案解析】 根据患者表现考虑是阴道壁血肿，应进行肛指检查以明确诊断。

20.

【正确答案】 E

【答案解析】 根据患者表现考虑是羊水栓塞，出现出血的主要原因是凝血功能障碍。

三、A3/A4 型题

1.

1) 下列哪项可以考虑是该患者的诊断

A.慢性宫颈炎

B.子宫内膜癌

C.无排卵性功能失调性子宫出血

D.输卵管癌

E.卵巢恶性肿瘤

【正确答案】 B

【答案解析】 子宫内膜癌为老年女性出现异常阴道流血可考虑的诊断。

2) 若该患者进行分段诊刮, 病理回报: 子宫颈管及宫腔刮出物, 浆液性乳头状腺癌。该

病理类型的临床特点是

- A. 雌激素依赖性
- B. 恶性度低
- C. 恶性度高
- D. 病程时间长
- E. 常局限于宫腔

【正确答案】 C

【答案解析】 非雌激素依赖性、恶性度高、病程时间短、易发生肌层浸润及转移等是子宫内膜浆液性乳头状腺癌特征。

3) 该患者有可能转移的部位有

- A. 双侧卵巢、输卵管转移
- B. 早期可有血行转移
- C. 腹股沟淋巴结转移
- D. 横膈表面腹膜种植
- E. 大网膜种植



【正确答案】 A

【答案解析】 双侧卵巢及输卵管，盆腔、腹腔腹膜种植，腹主动脉旁淋巴结转移是该患者可能的转移部位。最有可能的是卵巢和输尿管。

4) 患者病理检查结果为子宫内膜浆液性乳头状腺癌，侵及肌层约 1/2，累及宫颈黏膜，宫颈间质未侵及，卵巢、输卵管未见癌侵及，左髂外淋巴结可见癌转移。该患者分期应为

A. I a 期

B. I b 期

C. II a 期

D. II b 期

E. III c 期

【正确答案】 E

【答案解析】 III c 期指盆腔淋巴结阳性。

5) 该患者应采取的治疗方案为

A. 全子宫加双附件切除术

B. 广泛全子宫加双附件切除术



- C.筋膜外全子宫加双附件切除+盆腔淋巴结切除术
- D.广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除术
- E.广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除+腹主动脉旁淋巴结切除+大网膜+阑尾切除术

【正确答案】 E

【答案解析】 患者分期为Ⅲc期，应该选用广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除+腹主动脉旁淋巴结切除+大网膜+阑尾切除术。

6) 该患者术后应结合的治疗是

- A.化学治疗
- B.放射治疗
- C.己酸孕酮 500mg，肌内注射，每周 1 次，共 6 个月
- D.口服他莫西芬，每天 20mg,共 6 个月
- E.亮丙瑞林 3.75mg,皮下注射，每月 1 次，连用 6 个月

【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜浆液性乳头状腺癌对化疗敏感。

2.

1) 最可能的诊断是

A.子宫颈息肉

B.子宫颈结核

C.子宫颈癌

D.子宫内膜异位症

E.宫颈绒癌

【正确答案】 C

【答案解析】 子宫颈癌主要表现有阴道出血，为接触性出血；阴道排液，一般多发生在阴道出血之后，最初量不多，无臭。随着癌组织溃破，可流浆液性分泌物，晚期癌组织坏死，感染则出现大量脓性或米汤样恶臭白带。该患者病理改变为外生型，有息肉样或乳头状隆起，继而发展向阴道内突出的大小不等的菜花状赘生物脆易出血。子宫颈息肉、子宫颈结核、子宫内膜异位症及宫颈绒癌无恶臭白带。故选 C。

2) 为确定诊断。最可靠的诊断方法为

A.宫颈刮片细胞学检查

- B.碘试验
- C.阴道镜检查
- D.氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- E.宫颈活检

【正确答案】 E

【答案解析】 宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤，宫颈癌的三阶梯诊断依次为：宫颈刮片细胞学检查、阴道镜检查、宫颈活组织检查。其中最方便、最有适用价值的是宫颈刮片细胞学检查，而确诊需要病理学依据，故应做宫颈活组织检查。故选 E。

3) 确诊后，其临床期别为

- A. I A 期
- B. I B1 期
- C. I B3 期
- D. II A 期
- E. II B 期

【正确答案】 C

【答案解析】 根据宫颈癌分期 I B3 期肿瘤局限于宫颈，癌灶最大径线 $\geq 4\text{cm}$ 。所以选 C。

4) 最恰当的治疗方法为

A.宫颈锥切术

B.放射治疗

C.全子宫切除术

D.次广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术

E.广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术

【正确答案】 E

【答案解析】 手术治疗主要用于 I A ~ II A 的早期患者，其优点是年轻患者可保留卵巢和阴道功能。患者为 I B 期，应选用广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术。而宫颈锥切术用于原位癌。全子宫切除术主要用于 I A1 期患者。放射治疗适用于 II B 期以后及晚期患者。故选 E。

四、B 型题

1.

1) 妊娠高血压疾病患者出现头晕、头痛伴视力障碍时，考虑为

【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠高血压疾病患者出现头晕、头痛、且伴视力障碍时考虑视网膜剥脱。

2) 妊娠高血压疾病伴有肝酶升高，血小板下降，溶血时，考虑为

【正确答案】 B

【答案解析】 HELLP 综合征表现多为非特异性症状，确诊主要依靠实验室检查，诊断指标有血管内溶血、肝酶升高、血小板减少。

3) 妊娠高血压疾病并胎盘早剥时最严重的合并症为

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠高血压疾病合并胎盘早剥时最严重的合并症为 DIC。

2.

1) 多数的产后出血主要发生在产后的时间是

【正确答案】 B

【答案解析】 产后出血主要因为子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤及凝血功能障碍。

产时产程进展、胎盘残留、会阴侧切、软产道裂伤等因素，均增加产后短时间出血概率，产后 2 小时是产后出血的高峰期。

2) 初产妇，第二产程不应超过

【正确答案】 C

【答案解析】 第二产程：又称胎儿娩出期，指从宫口开全至胎儿娩出。未实施硬膜外麻醉者，初产妇最长不应超过 3 小时，经产妇不应超过 2 小时；实施硬膜外麻醉镇痛者，可在此基础上延长 1 小时，即初产妇最长不应超过 4 小时，经产妇不应超过 3 小时。所以应该选 C。

3) 经产妇，未实施硬膜外麻醉，第二产程不应超过

【正确答案】 B

【答案解析】 未实施硬膜外麻醉，初产妇第二产程不应超过 3 小时，经产妇 < 2 小时。

4) 初产妇第一产程潜伏期需要

【正确答案】 E

【答案解析】 第一产程又分为潜伏期和活跃期：①潜伏期为宫口扩张的缓慢阶段，初产妇



一般不超过 20 小时，经产妇不超过 14 小时。②活跃期为宫口扩张的加速阶段，可在宫口开至 4~5cm 即进入活跃期，最迟至 6cm 才进入活跃期，直至宫口开全 (10cm)。此期宫口扩张速度应 $> 0.5\text{cm/h}$ 。

3.

1) 第三产程中，子宫不协调性收缩可造成

【正确答案】 D

2) 胎盘未剥离时过早挤揉子宫可造成

【正确答案】 C

3) 胎盘与宫壁界限不清

【正确答案】 E

【答案解析】 1.胎盘嵌顿：子宫收缩不协调，子宫内口附近呈痉挛性收缩，形成狭窄环，使已完全剥离的胎盘嵌顿于子宫腔内，妨碍子宫收缩而出血。如血块积聚于子宫腔内，则呈

现隐性出血，但有时也可见大量外出血。

2.第三产程过早牵拉脐带或按压子宫，影响胎盘正常剥离，造成胎盘剥离不全。

3.胎盘植入：由于子宫蜕膜层发育不良或完全缺如，胎盘绒毛直接植入子宫肌层内，称为植入性胎盘。

