

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2023年第14期

问题索引:

1. 【问题】三腔两囊管压迫止血的位置在哪里?
2. 【问题】缩宫素到底是4~5滴开始滴还是10滴开始滴呢?
3. 【问题】院内感染分几种类型?
4. 【问题】护理诊断的陈述方式有哪些?

具体解答:

1. 【问题】三腔两囊管压迫止血的位置在哪里?

【解答】三腔二囊管,一个是胃气囊,压迫胃底贲门部胃底曲张的静脉;另一个是食管下段气囊,压迫食管曲张静脉。[医学教育网]

2. 【问题】缩宫素到底是4~5滴开始滴还是10滴开始滴呢?

【解答】缩宫素的静脉使用:将缩宫素2.5U加于0.9%生理盐水500ml内,从4~5滴/分开始静脉滴注并观察反应,根据宫缩的强弱进行调节,通常不超过60滴/分。宫缩间隔2~3分钟,持续40~60秒。若出现10分钟内宫缩超过5次、宫缩持续1分钟以上或胎心率有变化,应立即停止滴注。[医学/教育网]

3. 【问题】院内感染分几种类型?

【解答】医院感染按病原体的来源不同可分为外源性感染和内源性感染两类。

(1) 外源性感染(又称交叉感染) 指病原体来自于病人体外,通过直接或间接的途径,传播给病人所引起的感染。

(2) 内源性感染(又称自身感染) 指[医学教育网原创]病原体来自于病人自身所引起的感染。在病人体内或体表定植、寄生的正常菌群,正常情况下对人体无感染力而不致病;当人体的健康状况不佳、免疫功能受损、正常菌群移位,以及抗生素的不合理应用时,引起的机体感染。

4. 【问题】护理诊断的陈述方式有哪些?

【解答】护理诊断的陈述包括三个要素:问题(P),即护理诊断的名称;症状或


体征 (S); [医学教 育网]相关因素 (E), 多用 “与……有关” 来陈述。

护理诊断的陈述方式有 3 种:

三部分陈述 (PSE 公式) 多用于现存的护理诊断;

二部分陈述 (PE 公式) 多用于潜在危险的护理诊断;

一部分陈述只有 P, 多用于健康的护理诊断。



正保医学教育网

www.med66.com